

Acontia flavomaculata Oberthür, 1879, *ibid.* p. 16.

Aucha variegata: Warren, 1911, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 197. —Chen, 1982, *Icon. Het. Sin.* 3: 269.

Dimorphicosmia variegata: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, *Moths Jap.* 1: 775.

翅展 27—29 mm。头、胸灰白杂棕色；前翅红棕带灰黑色，内线棕色，前、后端浅黄色，外方 1 脉处一黄斑，环纹、肾纹黑边，外线棕色锯齿形，后段浅黄色，亚端线棕色锯齿形，前后端有黄点；后翅黑棕色。雌蛾头、胸粉黄色；前翅浅黄，基线、内线及外线黑色，后段内方青棕色，剑纹黄色，环纹及肾纹褐黄色，外线锯齿形，亚端线黄白色间断，与外线间为褐色区；后翅黄色，端带黑褐色弯曲，中线为黑弧形带；腹部黑棕色。

分布 黑龙江；俄罗斯。

天目灿夜蛾 *Aucha tienmushani* Draudt (图版 XXXIII-46)

Aucha tienmushani Draudt, 1950, *Mitt. munch. ent. Ges.* 40: 114, pl. 7, fig. 24. (西天目山)

Aucha tienmushani: Chu *et al.*, 1964, *Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct.* 2: 15. —Chen, 1982, *Icon. Het. Sin.* 3: 270.

翅展 39—45 mm。头部褐色杂灰色及黑色，下唇须外侧大部黑色；胸部背面褐，杂有灰色及黑色，颈板端半部黄褐色，但端部白色，翅基片基部褐黄色，足跗节外侧有黄斑；前翅大部灰褐色，亚中褶基部、翅端区、前缘脉至中室间、2 脉前后及 5 脉前后棕黄色，环纹与肾纹之间棕色，环纹褐黄色，肾纹大部分灰色，中央有不完整的褐圈，外线隐约可见双线棕色，亚端线黑色，内侧色较黑，在 7 脉与 4 脉处明显外凸，翅脉大部分黑灰色，前缘脉上有白点；后翅黄色，基部带有褐色，端区有一黑色宽带，其内缘在 2 脉处内凸，外缘在 2—3 脉间及亚中褶各有一黄纹；腹部灰褐色。

分布 浙江、湖南、福建、四川、云南。

黑褐灿夜蛾 *Aucha pronans* Draudt (图版 XXXIII-47)

Aucha pronans Draudt, 1950, *Mitt. munch. ent. Ges.* 40: 115. (云南丽江)

翅展 37 mm。头部与胸部黑褐色。复眼内侧的头顶与额杂有白色，颈板基部褐色，翅基片杂有白鳞；前翅黑褐色，基线不明显，黑色，波曲外弯，自前缘脉至 1 脉，内线黑色，微波曲外斜，环纹与肾纹微白，有黑边，外线黑色，自前缘脉后外弯，微波曲，4 脉后内斜，外方的前缘脉上有一列白点，亚端线不明显，黑色，外侧衬褐白色，锯齿形，端线黑色，由新月形纹组成，缘毛基部有一褐白波浪形线；后翅杏黄色，基部、后缘区及端区黑色，缘毛端半部杂黑色；腹部暗褐灰色，背毛簇黑色。

分布 云南。