

及端部白色；腹部褐灰色。雄蛾抱器瓣长，腹缘近端部凹，阳茎短（图 509）。

分布 青海、四川；克什米尔地区。

匹杰夜蛾 *Auchmis peterseni* (Christoph) (图版 XXXIV - 16)

Rhizogramma peterseni Christoph, 1887, Mem. Lep. 3: 76, pl. 4, fig. 3. (土库曼；伊朗)

Trichorhiza peterseni: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 14.

Delta peterseni: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 197. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 203.

Lepidodelta peterseni: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 246.

翅展 36 mm。头部与胸部灰色微带褐色，颈板端部及翅基片外缘黑色；前翅灰色，密布黑色细点，基线仅在前缘区可见双黑纹，剑纹黑色，内线双线黑色，波浪形外斜，环纹与肾纹相连，成“Y”形，黑边，外线双线黑色，线间灰白，在 6 脉处折角内斜，折角处外侧有一灰黑纹伸至顶角，臀角处有一灰黑纹伸至外线，端线由一系列新月形黑点组成；后翅白色，翅脉纹及端区褐黑色；腹部灰色。

分布 新疆；伊朗，中亚地区。

沙杰夜蛾 *Auchmis saga* (Butler) (图版 XXXIV - 17)

Lithophane saga Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 1: 198. (日本)

Rhizogramma aurilegula Oberthür, 1880, Et. ent. 5: 71.

Euscotia saga: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 243. —Lu, 1994, Butterflies & Moths Mt. Tai, p. 85.

Auchmis saga: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 760.

翅展 52—58 mm。头部与胸部灰色杂褐色，颈板中部有一黑横线，基部与近端部亦有微黑线，端部褐色，翅基线边缘有黑纹；前翅灰色微带褐色并布有褐色细点，翅脉纹褐色，亚中褶基部有一黑褐纹，基线双线黑色，外斜至中室，内线双线黑色，深锯齿形，后半内斜，环纹与肾纹不明显，前者斜，后端尖，近肾纹，外线双线黑色，深锯齿形，不清晰，内、外线之间在 1 脉后有一黑纵纹，端区有一列长短不一的黑色纵纹，在 4—6 脉间约成一暗斜纹，亚中褶处的黑纵纹较粗而长，翅外缘毛锯齿形；后翅白色带褐色，翅脉及端区褐色；腹部灰色，背面带褐色。

分布 黑龙江、山东；朝鲜，日本。

炫夜蛾属 *Actinotia* Hübner

Actinotia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 244.

Type-species: *Phalaena perspicillaris* Linnaeus.