

翅展 52 mm。头部与胸部灰色带绿褐色；前翅灰色，微带褐色及霉绿色，布有黑褐细点，内线黑褐色，外斜至中室后缘折角内斜，肾纹黑褐色，极窄小，前方有一黑褐纹，外线黑褐色，细波浪形外弯，至 2 脉基部折向后，亚端线不明显；后翅浅褐色；腹部灰褐色。

分布 新疆、西藏；中亚地区。

清隘夜蛾 *Autophila cataphanes* (Hübner) (图版 LIX-31)

Noctua cataphanes Hübner, [1813], Saaml. Eur. Schmett. 4: pl. 121, figs. 559. (欧洲)

Autophila cataphanes: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 371. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 366.

翅展 40 mm。头部与胸部淡褐灰色；前翅淡褐灰色，布有暗褐色细点，基线仅在前缘脉上现一黑纹，内线黑色，波浪形，在前缘区为一粗黑点，中室处不显，1 脉处内凸成齿形，环纹白色，黑边，中线黑色，波浪形，在中室处外弯，中室后内斜，肾纹白色，中有一黑条纹，环纹与肾纹间有一黑斑，外线黑色，波浪形，自前缘脉后外弯，4 脉后内斜，在中褶处内凸，亚端线黑色，不规则锯齿形，在 6、7 脉及 3、4 脉外凸明显，线内侧黑褐色，外侧衬褐灰色，外线与亚端线间的前缘脉上有 3 个黑点，翅外缘有一列衬白的黑点；后翅黄白色，外线暗灰色，端区带有暗灰色；腹部淡灰色。

分布 黑龙江、新疆、河北、甘肃、山东；日本，朝鲜，欧洲。

土隘夜蛾 *Autophila glebicolor* (Erschov) (图版 LIX-32)

Spintherops glebicolor Erschov, 1874, Fedtsch. Reis. p. 58, pl. 4, fig. 59. (Coxandensi 地区)

Dasythorax glebicolor: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 429, text fig. 148. ——Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 144.

翅展 39 mm。头部与胸部灰色带霉绿色；前翅暗褐黄色带霉绿色，内线黑褐色，大锯齿形外斜，肾纹褐黑色，小，外线黑褐色，强外弯，4 脉后强内弯，至 2 脉基部折角向后，亚端线浅黄色，不规则波曲，内侧色暗褐；后翅浅褐色；腹部污黄褐色。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆；中亚地区。

隐隘夜蛾 *Autophila inconspicua* (Butler) (图版 LIX-33)

Apopestes inconspicua Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 191. (日本)

Spintherops cataphanes var. *praeligaminosa* Staudinger, 1888.

体长 20 mm；翅展 40 mm。头部与胸部浅褐灰色；前翅淡褐灰色，布有暗褐细点，基线仅在前缘脉上现一黑纹，内线黑色，波浪形，在中室处不显，环纹白色黑边，中线黑色，波浪形，在中室处外弯，肾纹白色，中有一黑条，外线黑色，波浪形，前半内