

隘夜蛾属 *Autophila* Hübner

Autophila Hübner, [1823] 1816. Verz. bek. Schmett. p. 274.

Type-species: *Noctua dilucida* Hübner.

Cheirophanes Boursin, 1955, Z. Wien. ent. Ges. 40: 170.

喙发达，下唇须向上伸，第二节前缘有粗毛，第三节小，有时不易见，额微凸，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛丛；胸部及腹部鳞片平滑；前翅顶角较钝，外缘曲度平稳。

种 检 索 表

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. 体大，翅展 52 mm | 简隘夜蛾 <i>Autophila simplex</i> |
| 体中等大，翅展 40 mm 左右 | 2 |
| 2. 前翅中室后色暗 | 土隘夜蛾 <i>A. glebicolor</i> |
| 前翅一色 | 3 |
| 3. 雄蛾抱钩起于瓣中部 | 4 |
| 雄蛾抱钩起于瓣端部 | 毛隘夜蛾 <i>A. hirsuta</i> |
| 4. 抱钩粗肥 | 清隘夜蛾 <i>A. cataphaena</i> |
| 抱钩细 | 隐隘夜蛾 <i>A. inconspicua</i> |

毛隘夜蛾 *Autophila hirsuta* (Staudinger) (图版 LIX - 29)

Spintherops hirsuta Staudinger, 1870, Berl. ent. Zeit. 14: 123. (瑞士)

Dasythorax hirsuta: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 428. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 143, pl. 35b. —Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World p. 147.226. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 318.

Autophila hirsuta: Forster et al., 1971, Schmett. Mitteleur. p. 106.

翅展 40 mm。头部褐灰色，额布细黑点，下唇须外侧杂黑色；胸部背面褐灰色，下胸与足有黄白毛；前翅污黄褐色，布有暗褐细点，内线黑色模糊，自前缘脉外斜至中室后缘折角内斜，肾纹暗褐色，新月形，外线褐色模糊，自前缘脉外弯至 4 脉折向内，至肾纹后端再折向后行，亚端线隐约可见，内侧衬暗褐色，在 7 脉处外凸，中段外弯，缘毛端部浅褐黄色；后翅灰褐色，缘毛褐白色，基部赭黄色；腹部黄褐色。

分布 新疆、宁夏；伊朗，欧洲。

简隘夜蛾 *Autophila simplex* (Staudinger) (图版 LIX - 30)

Spintherops ? simplex Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 64. (伊犁地区)

Dasythorax simplex: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 143, pl. 35a, b.