

翅展 52 mm。头部与胸部灰色带绿褐色；前翅灰色，微带褐色及霉绿色，布有黑褐细点，内线黑褐色，外斜至中室后缘折角内斜，肾纹黑褐色，极窄小，前方有一黑褐纹，外线黑褐色，细波浪形外弯，至 2 脉基部折向后，亚端线不明显；后翅浅褐色；腹部灰褐色。

分布 新疆、西藏；中亚地区。

清隘夜蛾 *Autophila cataphanes* (Hübner) (图版 LIX - 31)

Noctua cataphanes Hübner, [1813], Saaml. Eur. Schmett. 4: pl. 121, figs. 559. (欧洲)

Autophila cataphanes: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 371. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 366.

翅展 40 mm。头部与胸部淡褐灰色；前翅淡褐灰色，布有暗褐色细点，基线仅在前缘脉上现一黑纹，内线黑色，波浪形，在前缘区为一粗黑点，中室处不显，1 脉处内凸成齿形，环纹白色，黑边，中线黑色，波浪形，在中室处外弯，中室后内斜，肾纹白色，中有一黑条纹，环纹与肾纹间有一黑斑，外线黑色，波浪形，自前缘脉后外弯，4 脉后内斜，在中褶处内凸，亚端线黑色，不规则锯齿形，在 6、7 脉及 3、4 脉外凸明显，线内侧黑褐色，外侧衬褐灰色，外线与亚端线间的前缘脉上有 3 个黑点，翅外缘有一列衬白的黑点；后翅黄白色，外线暗灰色，端区带有暗灰色；腹部淡灰色。

分布 黑龙江、新疆、河北、甘肃、山东；日本，朝鲜，欧洲。

土隘夜蛾 *Autophila glebicolor* (Erschov) (图版 LIX - 32)

Spintherops glebicolor Erschov, 1874, Fedtsch. Reis. p. 58, pl. 4, fig. 59. (Cocandensi 地区)

Dasythorax glebicolor: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 429, text fig. 148. ——Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 144.

翅展 39 mm。头部与胸部灰色带霉绿色；前翅暗褐黄色带霉绿色，内线黑褐色，大锯齿形外斜，肾纹褐黑色，小，外线黑褐色，强外弯，4 脉后强内弯，至 2 脉基部折角向后，亚端线浅黄色，不规则波曲，内侧色暗褐；后翅浅褐色；腹部污黄褐色。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆；中亚地区。

隐隘夜蛾 *Autophila inconspicua* (Butler) (图版 LIX - 33)

Apoptes inconspicua Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 191. (日本)

Spintherops cataphanes var. *praeligaminosa* Staudinger, 1888.

体长 20 mm；翅展 40 mm。头部与胸部浅褐灰色；前翅淡褐灰色，布有暗褐细点，基线仅在前缘脉上现一黑纹，内线黑色，波浪形，在中室处不显，环纹白色黑边，中线黑色，波浪形，在中室处外弯，肾纹白色，中有一黑条，外线黑色，波浪形，前半内

弯，亚端线黑色，锯齿形，翅外缘有一列衬白的黑点；后翅黄白色，外线暗灰色，端区带有暗灰色；腹部淡灰色。

分布 湖南；日本。

科夜蛾属 *Corsa* Walker

Corsa Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1101.

Type-species: *Corsa lignicolora* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节超过头顶，第三节长，雄蛾触角线形，胸部与腹部被鳞片，无毛簇；前翅顶角稍钝；后翅臀角稍内削。

种 检 索 表

- 前翅基部与端部黑色 科夜蛾 *Corsa lignicolora*
 前翅一色，有黑色亚顶斑 缘斑科夜蛾 *C. petrina*

科夜蛾 *Corsa lignicolora* Walker (图版 LIX-35)

Corsa lignicolora Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1101. (斯里兰卡)

Capnodes lignicolora: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 21.

Corsa lignicolora: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 99. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 141, pl. 14. fig. 272.

翅展 45 mm 左右。头部与胸部黄褐色杂蓝灰色及黑色，足外侧黑褐色，各跗节端部有褐黄色斑；前翅锈褐色，基部有一黑色大斑，其外缘内斜，外方另一黑色线，与之平行，环纹与肾纹褐黄色，轮廓模糊，亚中褶中部有一褐黄色纵纹，中线双线暗褐色，前端粗，黑色，至中室折角内斜，外线黑色，仅前缘脉至 4 脉间可见，前粗后细，微波曲，外侧衬淡黄色，亚端线淡黄色，弧形，其内方区域色浓，外弯渐近端线，其外方成一前宽后窄的黑弧纹，端线由一系列黑点组成，外侧均衬黄色，缘毛黄黑相间；后翅锈褐色，横脉纹粗，红棕色，中线隐约可见黑褐色，自 2 脉后外斜，在 1 脉折角向内，外侧衬黄色，外线隐约可见锯齿形，其外方区域红褐色，亚端线淡黄色，外弯至 5 脉即与端线相并行，在顶角处有一黑色曲纹，端线由一系列黑点组成，缘毛似前翅；腹部褐色。

分布 江西；锡金，斯里兰卡。

缘斑科夜蛾 *Corsa petrina* (Butler) (图版 LIX-36)

Bleptina petrina Butler, 1879, Ill. Het. colln Br. Mus. 3: 64, pl. 56, fig. 13. (日本横滨)

Panilla costipunctata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 550.

Hyposada otoensis Marumo, 1920, J. College Agric. Imp. Univ. Tokyo, 8: 262.