

## 隘夜蛾属 *Autophila* Hübner

*Autophila* Hübner, [1823] 1816. Verz. bek. Schmett. p. 274.

Type-species: *Noctua dilucida* Hübner.

*Cheirophanes* Boursin, 1955, Z. Wien. ent. Ges. 40: 170.

喙发达，下唇须向上伸，第二节前缘有粗毛，第三节小，有时不易见，额微凸，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛丛；胸部及腹部鳞片平滑；前翅顶角较钝，外缘曲度平稳。

### 种 检 索 表

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. 体大，翅展 52 mm .....   | 简隘夜蛾 <i>Autophila simplex</i> |
| 体中等大，翅展 40 mm 左右 ..... | 2                             |
| 2. 前翅中室后色暗 .....       | 土隘夜蛾 <i>A. glebicolor</i>     |
| 前翅一色 .....             | 3                             |
| 3. 雄蛾抱钩起于瓣中部 .....     | 4                             |
| 雄蛾抱钩起于瓣端部 .....        | 毛隘夜蛾 <i>A. hirsuta</i>        |
| 4. 抱钩粗肥 .....          | 清隘夜蛾 <i>A. cataphaena</i>     |
| 抱钩细 .....              | 隐隘夜蛾 <i>A. inconspicua</i>    |

### 毛隘夜蛾 *Autophila hirsuta* (Staudinger) (图版 LIX - 29)

*Spintherops hirsuta* Staudinger, 1870, Berl. ent. Zeit. 14: 123. (瑞士)

*Dasythorax hirsuta*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 428. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 143, pl. 35b. —Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World p. 147.226. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 318.

*Autophila hirsuta*: Forster et al., 1971, Schmett. Mitteleur. p. 106.

翅展 40 mm。头部褐灰色，额布细黑点，下唇须外侧杂黑色；胸部背面褐灰色，下胸与足有黄白毛；前翅污黄褐色，布有暗褐细点，内线黑色模糊，自前缘脉外斜至中室后缘折角内斜，肾纹暗褐色，新月形，外线褐色模糊，自前缘脉外弯至 4 脉折向内，至肾纹后端再折向后行，亚端线隐约可见，内侧衬暗褐色，在 7 脉处外凸，中段外弯，缘毛端部浅褐黄色；后翅灰褐色，缘毛褐白色，基部赭黄色；腹部黄褐色。

分布 新疆、宁夏；伊朗，欧洲。

### 简隘夜蛾 *Autophila simplex* (Staudinger) (图版 LIX - 30)

*Spintherops ? simplex* Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 64. (伊犁地区)

*Dasythorax simplex*: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 143, pl. 35a, b.

翅展 52 mm。头部与胸部灰色带绿褐色；前翅灰色，微带褐色及霉绿色，布有黑褐细点，内线黑褐色，外斜至中室后缘折角内斜，肾纹黑褐色，极窄小，前方有一黑褐纹，外线黑褐色，细波浪形外弯，至 2 脉基部折向后，亚端线不明显；后翅浅褐色；腹部灰褐色。

**分布** 新疆、西藏；中亚地区。

### 清隘夜蛾 *Autophila cataphanes* (Hübner) (图版 LIX-31)

*Noctua cataphanes* Hübner, [1813], Saaml. Eur. Schmett. 4: pl. 121, figs. 559. (欧洲)

*Autophila cataphanes*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 371. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 366.

翅展 40 mm。头部与胸部淡褐灰色；前翅淡褐灰色，布有暗褐色细点，基线仅在前缘脉上现一黑纹，内线黑色，波浪形，在前缘区为一粗黑点，中室处不显，1 脉处内凸成齿形，环纹白色，黑边，中线黑色，波浪形，在中室处外弯，中室后内斜，肾纹白色，中有一黑条纹，环纹与肾纹间有一黑斑，外线黑色，波浪形，自前缘脉后外弯，4 脉后内斜，在中褶处内凸，亚端线黑色，不规则锯齿形，在 6、7 脉及 3、4 脉外凸明显，线内侧黑褐色，外侧衬褐灰色，外线与亚端线间的前缘脉上有 3 个黑点，翅外缘有一列衬白的黑点；后翅黄白色，外线暗灰色，端区带有暗灰色；腹部淡灰色。

**分布** 黑龙江、新疆、河北、甘肃、山东；日本，朝鲜，欧洲。

### 土隘夜蛾 *Autophila glebicolor* (Erschov) (图版 LIX-32)

*Spintherops glebicolor* Erschov, 1874, Fedtsch. Reis. p. 58, pl. 4, fig. 59. (Cocandensi 地区)

*Dasythorax glebicolor*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 429, text fig. 148. ——Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 144.

翅展 39 mm。头部与胸部灰色带霉绿色；前翅暗褐黄色带霉绿色，内线黑褐色，大锯齿形外斜，肾纹褐黑色，小，外线黑褐色，强外弯，4 脉后强内弯，至 2 脉基部折角向后，亚端线浅黄色，不规则波曲，内侧色暗褐；后翅浅褐色；腹部污黄褐色。

**分布** 黑龙江、内蒙古、新疆；中亚地区。

### 隐隘夜蛾 *Autophila inconspicua* (Butler) (图版 LIX-33)

*Apoptes inconspicua* Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 191. (日本)

*Spintherops cataphanes* var. *praeligaminosa* Staudinger, 1888.

体长 20 mm；翅展 40 mm。头部与胸部浅褐灰色；前翅淡褐灰色，布有暗褐细点，基线仅在前缘脉上现一黑纹，内线黑色，波浪形，在中室处不显，环纹白色黑边，中线黑色，波浪形，在中室处外弯，肾纹白色，中有一黑条，外线黑色，波浪形，前半内