

Hypaetra stigmatica: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 60, pl. 223. fig. 5.

翅展 42—48 mm。头部与胸暗褐色带紫灰色，额下部白色，两侧有黑斑，下唇须外侧白色带黑色，颈板基部杂少许白色，下胸白色，足有黑斑；前翅褐色带紫灰色，部分带黑色，基线黑色，波浪形，自前缘脉至 1 脉，内线双线黑色，外一线粗，细波浪形外斜，内一线自亚中褶折向内斜，两线间成一黑褐色近三角形大斑，环纹只现一黑点，中线黑色，波浪形外弯，肾纹窄，褐色，内、外缘模糊黑色，外侧有一近圆形黑斑，其外缘达外线，外线双线黑色，锯齿形，自 9 脉后内斜，内一线前半间断为粗点，在 2—3 脉间成一小圆斑，外区前缘脉黑色，有 3 个黄白点，亚端线隐约可见，6 脉前间断为黑点列，翅外缘有一列三角形黑纹，外侧衬黄白色，缘毛波浪形，基部黄白色；后翅暗褐色，亚端区可见几个黑纹；腹部褐色。

分布 海南；印度。

宇夜蛾 *Avatha discolor* (Fabricius) (图版 LIV-27)

Noctua discolor Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3: 50. (印度)

Avatha includens Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1107.

Hypaetra discolor: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 63.

Avatha discolor: Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 487. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 851. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 135.




图 627 宇夜蛾 *Avatha discolor* (Fabricius) ♂ 外生殖器

翅展 45 mm。头、胸褐色杂少许黑色；前翅灰褐色，前缘区有灰白色，亚中褶基部有端白的鳞簇，基线黑褐色，内线前端为小黑斑，中部为棕色斑，在亚中褶为大黑斑，环纹为黑点，中线红棕色，中室外一近三角形黑斑，外线黑褐色，中段外方一深棕斑，外区有黑碎纹；后翅与腹部灰褐色。雄蛾抱器腹突约呈指形，阴茎长，端部较细(图 627)。

分布 浙江；印度，印度尼西亚，大洋洲。

暮宇夜蛾 *Avatha noctuoides* (Guenée) (图版LIV-28)

Hypaetra noctuoides Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 259. (爪哇)

Hypaetra noctuoides: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 507. —Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 64, text fig. 17. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 358. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1017.

翅展 39 mm。头部暗褐色，下唇须第一、二节外侧黑棕色；胸部背面暗红褐色，足跗节各节间有黄白斑；前翅暗灰褐色，布有灰色及黑褐色细点，前缘区近基部有一小黑斜纹，其后端缩成一外伸的细钩，内区有 2 黑斑，分别位于前缘区及亚中褶，前者小，后者大，约呈肾形，边缘有黄白细点组成的细线，中线暗褐色，波浪形外弯，肾纹暗灰色，中有黑色细点，内缘微凹，外围黑鳞，外线暗褐色，不明显，自前缘脉后外弯，其后波曲并贴近肾纹，亚端线不清晰，暗褐色，在 7 脉后外凸，在 2—5 脉间锯齿形外弯，其后微弱，端线黑褐色，锯齿形；后翅暗褐色，隐约可见外线与亚端线，端区带有灰色，缘毛基部有一灰白线；腹部暗褐色。

分布 湖南、广东、海南；印度，缅甸，印度尼西亚。

启夜蛾属 *Caenurgia* Walker

Caenurgia Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1464, 1491.

Type-species: *Caenurgia socors* Walker.

Litosea Grote, 1875, Can. Ent. 7: 49.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，额光滑，无突起，上部有毛簇，复眼大，圆形，雄蛾触角双栉形或线形，胸部背面无毛簇，各足胫节均具刺；前翅稍长窄，有一副室，后翅中室长约为翅之半，5 脉发达，自中室下角略前发出。

楔斑启夜蛾 *Caenurgia fortalitium* (Tausch) (图版LIV-29)

Noctua fortalitium Tausch, 1809, Mem. Mosc. p. 323, pl. 20, fig. 7. (俄罗斯)

Noctua fortalilium [sic] Hübner, 1818, Eur. Schmett., Noct. fig. 592.

Caenurgia fortalitium: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 66, text fig. 18. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 153.

Gonospileia fortalitium: Chu et al., 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 113.

翅展 35 mm。头部与胸部灰色杂褐色；前翅浅灰色，布有暗褐细点，中室后有一褐斑，约呈楔形，其后缘沿 1 脉外伸达 1 脉中部，其外缘中凹，均衬以黑色及白色边，