

戎恭夜蛾 *Euclidia munita* (Hübner) (图版LIV-25)

Noctua munita Hübner, [1813], Eur. Schmett., Noct. pl. 129, fig. 593. (欧洲)

Euclidia angulosa Eversmann, 1832, Nouv. Mem. Misc. 2: 353.

Gonospileia munita: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 54. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 344. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 358.

翅展 30 mm。头部褐色，触角干基部上缘白色；胸部背面褐色；前翅淡褐色，大部带有暗褐色，内区有一斜三角形黑棕色斑，其两侧衬白色，其内缘自前缘脉至 1 脉，外缘强外斜，自前缘脉至近翅后缘中部，外线黑色，外侧衬白色，自前缘脉后外斜，在 6 脉处折向内斜，至 3 脉后垂，线内侧有一黑棕色宽条，外线后半的外方带有黄色，亚端线暗褐色，细波浪形，模糊，在中褶处稍外弯，后端达臀角，顶角区微带黄色，端区中部棕色；后翅褐黄色，亚端线暗褐色，较模糊，呈带状，在中褶处折角内斜，后端达臀角；腹部褐黄色。

分布 新疆；欧洲。

宇夜蛾属 *Avatha* Walker

Avatha Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1106.

Type-species: *Avatha includens* Walker.

Pseudathyrma Butler, 1892, Ann. Mag. nat. Hist. 6, 10: 299.

Pterochaeta Holland, 1900, Nov. zool. 7: 568.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节长，斜向前伸，额平滑无突起，有尖毛簇，雄蛾触角线形，胸部与腹部被鳞片，雄蛾前足胫节饰长毛，中足胫节具刺，后足胫节无刺。

种 检 索 表

1. 雄蛾触角有鬃，前翅反面中室前有粗鳞 斑宇夜蛾 *Avatha stigmatica*
- 雄蛾触角无鬃，前翅反面中室前无粗鳞 2
2. 前翅中室外有黑纹 宇夜蛾 *A. discolor*
- 前翅中室外无黑纹 普宇夜蛾 *A. noctuoides*

斑宇夜蛾 *Avatha stigmatica* (Hampson) (图版LIV-26)

Hypaëtra stigmatica Hampson, 1877, Proc. zool. Soc. Lond. p. 610. (安达曼群岛)

Athyma tripunctata Pagenstecher, 1888, Jahr, Nass. Ver. Natur. 41: 149.

Pterochaeta dohertyi Holland, 1900, Nov. zool. 7: 568.

Hypaetra stigmatica: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 60, pl. 223. fig. 5.

翅展 42—48 mm。头部与胸暗褐色带紫灰色，额下部白色，两侧有黑斑，下唇须外侧白色带黑色，颈板基部杂少许白色，下胸白色，足有黑斑；前翅褐色带紫灰色，部分带黑色，基线黑色，波浪形，自前缘脉至 1 脉，内线双线黑色，外一线粗，细波浪形外斜，内一线自亚中褶折向内斜，两线间成一黑褐色近三角形大斑，环纹只现一黑点，中线黑色，波浪形外弯，肾纹窄，褐色，内、外缘模糊黑色，外侧有一近圆形黑斑，其外缘达外线，外线双线黑色，锯齿形，自 9 脉后内斜，内一线前半间断为粗点，在 2—3 脉间成一小圆斑，外区前缘脉黑色，有 3 个黄白点，亚端线隐约可见，6 脉前间断为黑点列，翅外缘有一列三角形黑纹，外侧衬黄白色，缘毛波浪形，基部黄白色；后翅暗褐色，亚端区可见几个黑纹；腹部褐色。

分布 海南；印度。

宇夜蛾 *Avatha discolor* (Fabricius) (图版 LIV-27)

Noctua discolor Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3: 50. (印度)

Avatha includens Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1107.

Hypaetra discolor: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 63.

Avatha discolor: Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 487. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 851. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 135.




图 627 宇夜蛾 *Avatha discolor* (Fabricius) ♂ 外生殖器

翅展 45 mm。头、胸褐色杂少许黑色；前翅灰褐色，前缘区有灰白色，亚中褶基部有端白的鳞簇，基线黑褐色，内线前端为小黑斑，中部为棕色斑，在亚中褶为大黑斑，环纹为黑点，中线红棕色，中室外一近三角形黑斑，外线黑褐色，中段外方一深棕斑，外区有黑碎纹；后翅与腹部灰褐色。雄蛾抱器腹突约呈指形，阴茎长，端部较细(图 627)。