

处外凸，2—5脉间外弯，端线黑色，缘毛褐色杂有黑褐色；后翅暗灰褐色，外半部色较暗，缘毛浅褐色；腹部暗灰褐色。

分布 江西；日本。

四线元夜蛾 *Avitta quadrilinea* (Walker) (图版 LX-22)

Asta quadrilinea Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc. 7: 171. (Borneo; Sarawak)

Bocana quadrilinealis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 88.

Avitta quadrilinea: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 29. ——Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 39, fig. 252. ——Barlow, 1982, Moths SE. Asia p. 110, pl. 37, fig. 14.

翅展 47 mm。头部与胸部暗棕色带紫色，下唇须斜向上伸，第三节细长；前翅暗棕色带紫色，内线、中线、外线及亚端线均黑褐色，自前缘脉直线内斜至翅后缘，亚端线与翅外缘之间另有一黑褐色波浪形细线；后翅黑褐色；腹部黑棕色带紫灰色，臀毛簇褐色。

分布 江西；锡金，印度，马来西亚。

岛元夜蛾 *Avitta ophiusalis* (Walker) (图版 LX-20)

Bocana ophiusalis Walker, [1859], 1858 Cat. 16: 173. (斯里兰卡)

Toxocampa lunifera Druce, 1888, Proc. zool. Soc. p. 575.

Imleanga fluviatilis Leca, 1901, Proc. Roy. Soc. Qd. 16: 83.

Pantura ophiusalis: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 247. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 145.

Mecodina ophiusalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 6.

翅展 38 mm 左右。头部与颈板深棕色，雄蛾触角锯齿形，胸部背面灰褐色，足跗节外侧深棕色，各节端部有黄白斑；前翅灰褐色带深棕色，基部有一黑棕色点，内线双线深褐色，微曲外斜，内一线弱，环纹只现一白点，肾纹黑棕色，略似蝙蝠形，中线黑棕色，外斜，外线双线，内一线黑棕色，自前缘脉外斜至 7 脉，折角向后，至亚中褶后再折向内斜，外一线灰黄色，内侧衬褐色，曲度与内一线相似，但前段较平缓，亚端线灰黄色，内侧衬深褐色，前缘脉至 6 脉间微呈锯齿形，前段内方有一棕色斜方形斑；后翅暗褐色，缘毛色淡。

分布 海南；斯里兰卡。

泛夜蛾属 *Cephenia* Moore

Cephenia Moore, 1882, Lep. Atk. p. 196.

Type-species: *Cephaena costata* Moore.