




图 245 朽木夜蛾 *Axylia putris* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

内线内方均带褐色，中室前带有黑色，基线、内线及外线均双线黑色，后者锯齿形，亚端线部分呈褐色并有黑纵纹，剑纹黑边，环、肾纹微黄，黑边；后翅黄白微带褐色；翅脉黑褐色；腹部暗褐色。雄蛾抱器瓣窄，冠分明，抱钩端部弯而尖（图 245）。

分布 黑龙江、新疆、河北、山西、湖南；日本，朝鲜，锡金，印度，欧洲。

干朽木夜蛾 *Axylia sicca* Guenée (图版 XIV-9)

Axylia sicca Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 1: 135. (未注明模式产地)

Axylia sicca: Boursin, 1928, Ency. ent. Ser. B. 2: 51, pl. 4, fig. 3. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 290.

Diarsia sicca: Kapur et Arora, 1971, Rec. zool. Surv. India, 65: 149, fig. 21. —Poole, 1989, Lepid. Cat. p. 317.

翅展 28mm。头与前翅赭色；胸部黑色；前翅前缘区带有灰黑色，亚前缘脉、径脉及中室基部各一白纹，基线、内线及外线均双线黑色，后者锯齿形，中线后半黑色，环、肾纹赭色，黑边，后者外侧一黑条伸至端线，亚中褶端部一黑斑；后翅浅黄，横脉纹及翅脉微黑；腹部褐色。

分布 四川、西藏；印度。

阴朽木夜蛾 *Axylia opacata* Chen (图版 XIV-10)

Axylia opacata Chen, 1993, Acta ent. Sin. 36 (1): 88, fig. 1 male genitalia. (云南沧源)

翅展 28mm。头部与胸部棕色，下唇须外侧黑褐色，额与头顶有黑褐纹，颈板有黑褐弧纹，翅基片外缘赭黄色，前、后胸有黑鳞簇；前翅赭黄色，前缘区带有黑褐色，中




图 246 阴朽木夜蛾 *Axylia opacata* Chen ♂ 外生殖器

室基部有一暗褐纵线，内线隐约可见大锯齿形，环纹大，黑色，淡赭黄边，肾纹黑色，新月形，褐黄边，周围模糊黑褐色，外端有一小黑斑，2—5脉基部有黑鳞，端区4—6脉间有一近三角形黑纹，端线由一系列三角形黑点组成，4—6脉间的外缘毛杂黑色；后翅灰褐色；腹部暗褐色。雄蛾抱器瓣宽，抱钩长（图246）。

分布 云南。

鲁夜蛾属 *Xestia* Hübner

Xestia Hübner, 1818, Zutr. Samml. (exot.) Schm. 2: 16.
Type-species: *Noctua ochreago* Hübner.
Amathes Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schm. p. 222.
Pachnobia Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. p. 341.
Anomogyna Staudinger, 1871, Cat. Lep. eur. Fn. p. 110.

喙发达，下唇须向上斜伸或向前伸，前缘饰毛，额光滑无突起，雄蛾触角线形、锯齿形或双栉形，各足胫节具刺或仅中、后足胫节具刺，雄蛾抱器瓣背、腹缘近平行，多具有抱器腹端突。

种和亚种检索表

1. 雄蛾触角双栉形	2
雄蛾触角非双栉形	8
2. 前翅中室后缘黑色	3
前翅中室后缘不黑	5