

斜，并呈锯齿形，4脉后两线相距较宽，内一线强锯齿形，内凸于3脉及亚中褶，外一线模糊，亚端线模糊褐色，在7脉处外凸，中段外弯，线内侧衬白色，外线与亚端线之间有一明显黑曲线，自前缘微波浪形内弯，至6脉后渐斜向外伸，端部达翅外缘，亚中褶端半部有一黑纵线，近翅外缘有一列模糊黑点，缘毛灰色杂暗褐色；后翅白色，端区有一暗褐带，端线黑褐色波浪形，缘毛白色间黑褐色；腹部浅灰色微带褐色。

分布 广东、云南；印度，斯里兰卡，东南亚。

印夜蛾 *Bamra albicola* (Walker) (图版 LIX-10)

Felinia albicola Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 12: 1515. (印度)

Agriopsis discalis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 57, pl. 7, fig. 2.

Bamra diplostigma Hampson, 1893, Ill. Het. 9: 109, pl. 163, fig. 7.

Polydesma discalis ssp. *melli* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 162.

Polydesma albicola: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 466.

Bamra albicola: Barlow, 1982, Moths SE. Asia p. 110, pl. 37, fig. 18.

翅展 45 mm。头部与胸部灰色微带褐色，下唇须第一节及第二节基部外侧黑色，足跗节外侧黑色，各节间有灰白斑；前翅浅灰色微带褐色，基线黑色，不明显，自前缘脉外弯至1脉，内线黑色，微波曲外斜，在亚中褶处折角内斜，线内方带黑褐色，中线双线黑色，极模糊，在中室前不显，外线双线黑色，两线相距较远，内一线自前缘脉微波曲外斜，5脉后折向内达中室横脉后端折角后行，外一线在前缘脉后强外突，6脉后内斜，5脉后强外斜，在3、4脉间成一外突齿，其后与内一线曲度相似，亚端线黄白色，细锯齿形，在3、4脉间成一强外突齿，线内侧黑褐色，外线与亚端线间在6脉前带黑褐色较浓，似成一斗形大暗斑，端线黑色，波浪形；后翅白色，端区黑褐色，成带状，隐约可见黑褐色亚端线，臀角有一黄白纹；腹部灰色微带褐色。

分布 江苏、浙江、湖南、台湾、广东；印度，马来西亚，印度尼西亚。

桨夜蛾属 *Rema* Swinhoe

Rema Swinhoe, 1900, Cat. east & Aust. Lep. Het. 2: 121.

Type-species: *Toxocampa costimacula* Guenée.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，胸部被平滑鳞片，雄蛾中足胫节与腿节之间有长毛簇，前翅顶角稍尖，雄蛾后翅基部的反面有平滑鳞片，5脉发达。

桨夜蛾 *Rema costimacula* (Guenée) (图版 LIX-7)

Toxocampa costimacula Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 429.

(锡金)