

Moths SE Asia, p. 93. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 339.

翅展 47—58mm。头、胸灰色杂褐色；前翅灰褐至棕褐色，有紫褐细纹，后缘区微白，内线黑色，前段内侧一黑斑，中段内侧有暗点，环纹灰褐色黑边，中有竖鳞，肾纹似桃形，外端尖，褐色黑边，中有竖鳞，外线双线褐色波浪形，前段外侧一黑褐斑，亚端线灰白色波浪形，亚中褶端部一黑纹，翅外缘一列黑点；后翅浅黄褐至褐色；缘毛黄白色；腹部浅灰褐色。

寄主 乌桕。

分布 江苏、浙江、湖北、湖南、江西、台湾、福建、广东、海南、广西、贵州；印度，锡金，缅甸，印度尼西亚，新加坡。

玉夜蛾属 *Barasa* Walker

Barasa Walker, 1862, J. Linn. Soc., Zool. 6: 192.

Type-species: *Barasa acronyctoides* Walker.

Ceparcha Meyrick, 1889, Trans. ent. Soc. p. 476.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节长，额光滑，上方有鳞脊，复眼大，圆形，雄蛾触角有长纤毛；胸部主要被鳞片，后胸有鳞簇；腹部基部几节背面有毛簇；前翅有一短副室，雄蛾前翅反面在 1 脉近基部或有长毛簇；后翅 3、4 脉共柄。

玉夜蛾 *Barasa acronyctoides* Walker (图版 XLIV-9)

Barasa acronyctoides Walker, 1862, Trans. ent. Soc. 1: 192. (Sarawak)

Sarothripa caradrinoides Snellen, 1879, Tijds. v. Ent. 22: 94.

Barasa cana Hampson, 1893, Ill. Het. Br. Mus. 9: 24, 107.

Barasa acronyctoides: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 377. ——Hampson, 1912, Cat. Lep.

Phal. Br. Mus. 11: 389. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 405, pl. 31e. ——Barlow, 1982, Moths SE Asia p.94.

翅展 28mm。头、胸及前翅白色，前翅内半带褐色，各横线黑褐色，基线后半为三角形小斑状，内线前端为小黑斑，其后波浪形，环纹、肾纹由黑褐竖鳞组成，外线前端为近三角形小斑，外区前缘有三个黑褐小斑，亚端线锯齿形，间断，翅外缘一列黑褐点；后翅白色，翅脉及端区褐色；腹部褐白色。

寄主 番樱桃属。

分布 海南；印度，斯里兰卡，马来西亚，新加坡。

润皮夜蛾属 *Labanda* Walker

Labanda Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 17: 284.