

Type-species: *Batracharta obliqua* Walker.

Carissa Walker, 1863, J. Proc. Linn. Soc., Zool. 7: 168.

Pilosocrures Hampson, 1891, Ill. Spec. Lep. Het. Colln Br. Mus. 8: 18, 85.

喙发达, 下唇须向上伸, 第二节达头顶, 第三节长, 端部钝, 雄蛾触角线形, 有纤毛丛, 中, 后足胫节饰长, 腹部长, 超出后翅, 基部几节背面有毛簇, 前翅外缘斜圆, 臀角微向后凸, 有副室。

种 检 索 表

体小, 翅展 33 mm. 碎纹巴夜蛾 *Batracharta cossoides*
 体大, 翅展 45 mm. 雀斑巴夜蛾 *B. irrorata*

雀斑巴夜蛾 *Batracharta irrorata* Hampson (图版 LIX-16)

Batracharta irrorata Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 444, text fig. 251. (印度)

Batracharta irrorata: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 140. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn Xizang p. 351.

翅展 45 mm 左右。头部与胸部黑色杂黄褐色, 下唇须外侧黑棕色, 内侧褐黄色, 足外侧黑褐色, 各跗节端部有白斑, 后胸毛簇赤褐色, 前翅一黑线自前缘脉外 213 外弯至 3 脉, 向内弯至 2 脉基部, 折角内斜, 至 1 脉后再折向内达后缘基部, 此线内方区域褐黑色, 在前缘脉上可见一列褐黄色点, 环纹与肾纹隐约可见褐黄色, 轮廓不清, 褐黑色区的前部与外端部有黑色碎纹, 黑线外方区域红褐色, 密布黑色碎纹, 亚端区有少许白点, 近外缘有一褐黑色线, 不规则锯齿形, 端区后半有一褐黑色内斜纹, 缘毛红褐色, 后翅黄褐色, 缘毛赭黄色; 腹部黄褐色, 背面带黑灰色。

分布 四川; 印度。

碎纹巴夜蛾 *Batracharta cossoides* (Walker) (图版 LIX-17)

Carissa cossoides Walker, [1863] 1864, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. p. 168. (Sarawak)

Batracharta cossoides: Warren, 1913, *in* Seitz, *Macrolep. World* 3: 368. —Draudt, 1950, *Mitt. munch. ent. Ges.* 40: 164. —Chen, 1985, *Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct.* 4: 140. —Chen, 1992, *in* Peng, *Icon. For. Ins. Hunan* p. 1024.

翅展 33 mm 左右。头部与胸部深褐色, 额、触角基部杂灰黄色, 头顶杂褐黑色, 下胸褐黑色, 足外侧褐黑色, 各跗节端部有白斑; 前翅中线以内区域褐黑色, 其余大部红棕色, 中线黑色, 自中室内斜, 至 1 脉后折向内, 外线黑色, 自前缘脉外斜, 至 6 脉成一尖角, 在 4 脉成一钝外突角, 其后弧形绕至 3 脉基部, 线内侧褐黑色, 在 4—7 脉间有黑色波曲线, 端区有不清晰的黑色碎纹, 翅脉棕红色, 近外缘有一黑色细线; 后翅暗褐色, 缘毛淡赭黄色; 腹部黄褐带灰色。

分布 福建、江西；马来西亚。

靛夜蛾属 *Belciana* Walker

Belciana Walker, 1862, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 6: 182.

Type-species: *Dandaca biformis* Walker.

Nalca Walker, 1866. List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1983.

Dipheroides Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 203.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长，触角线形；胸部被平滑鳞片；前翅较宽，顶角稍尖；后翅宽；腹部较短。

种 检 索 表

- 前翅仅中线明显 靛夜蛾 *Belciana biformis*
 前翅各横线明显 新靛夜蛾 *B. staudingeri*

靛夜蛾 *Belciana biformis* (Walker) (图版 LIX-19)

Dandaca biformis Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1761. (Sarawak)

Pandesma hemodi Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 111, fig. 25.

Polydesma biformis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 971.

Belciana biformis: Barlow, 1982, Moths S. E. Asia p. 108, pl. 37, fig. 4.

翅展 43 mm。头部褐色，头顶绿色；胸部背面绿色，颈板基部褐色；前翅白色带绿色，基线为一黑褐斑，自前缘脉至亚中褶，其内缘中部外弯，外缘在中室后强内斜，此斑在中室处色浅或间断，前缘脉基部有一黑褐点，中室有一不清晰白斑，中线黑褐色，自前缘脉微曲外斜至 4 脉折角内斜，在前缘脉上为小斑状，在 2 脉处内凸成一齿，外线不清晰，白色，由新月形纹组成，自前缘脉微曲后行至 5 脉处外斜至亚端区，4 脉后内斜并明显间断，线外侧有一列黑点，外方在 4 脉前红褐色，成一近方形大斑，亚中褐端部有一红褐斑，端线由一系列新月形黑褐点组成，缘毛绿色间褐色；后翅黄褐色，隐约可见褐色微波曲中线与外线，端区有一黑褐宽带，其内缘波曲，端线黑褐色，波浪形，缘毛浅褐黄色，中有一模糊暗褐线；腹部浅褐色，背面带绿色。

分布 海南；泰国，印度，斯里兰卡，马来西亚。

新靛夜蛾 *Belciana staudingeri* (Leech) (图版 LIX-20)

Polydesma staudingeri Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 551. (朝鲜)

Daseochaeta trinubila Draudt, 1937, Ent. Rdsch. 54: 374, pl. 4, fig. 3a.

Belciana staudingeri: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 368. —Kozhantschikov,