

Type-species: *Batracharta obliqua* Walker.

Carissa Walker, 1863, J. Proc. Linn. Soc., Zool. 7: 168.

Pilosocrures Hampson, 1891, Ill. Spec. Lep. Het. Colln Br. Mus. 8: 18, 85.

喙发达, 下唇须向上伸, 第二节达头顶, 第三节长, 端部钝, 雄蛾触角线形, 有纤毛丛, 中, 后足胫节饰长, 腹部长, 超出后翅, 基部几节背面有毛簇, 前翅外缘斜圆, 臀角微向后凸, 有副室。

种 检 索 表

体小, 翅展 33 mm. 碎纹巴夜蛾 *Batracharta cossoides*
 体大, 翅展 45 mm. 雀斑巴夜蛾 *B. irrorata*

雀斑巴夜蛾 *Batracharta irrorata* Hampson (图版 LIX-16)

Batracharta irrorata Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 444, text fig. 251. (印度)

Batracharta irrorata: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 140. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn Xizang p. 351.

翅展 45 mm 左右。头部与胸部黑色杂黄褐色, 下唇须外侧黑棕色, 内侧褐黄色, 足外侧黑褐色, 各跗节端部有白斑, 后胸毛簇赤褐色, 前翅一黑线自前缘脉外 213 外弯至 3 脉, 向内弯至 2 脉基部, 折角内斜, 至 1 脉后再折向内达后缘基部, 此线内方区域褐黑色, 在前缘脉上可见一列褐黄色点, 环纹与肾纹隐约可见褐黄色, 轮廓不清, 褐黑色区的前部与外端部有黑色碎纹, 黑线外方区域红褐色, 密布黑色碎纹, 亚端区有少许白点, 近外缘有一褐黑色线, 不规则锯齿形, 端区后半有一褐黑色内斜纹, 缘毛红褐色, 后翅黄褐色, 缘毛赭黄色; 腹部黄褐色, 背面带黑灰色。

分布 四川; 印度。

碎纹巴夜蛾 *Batracharta cossoides* (Walker) (图版 LIX-17)

Carissa cossoides Walker, [1863] 1864, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. p. 168. (Sarawak)

Batracharta cossoides: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 368. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 164. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 140. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1024.

翅展 33 mm 左右。头部与胸部深褐色, 额、触角基部杂灰黄色, 头顶杂褐黑色, 下胸褐黑色, 足外侧褐黑色, 各跗节端部有白斑; 前翅中线以内区域褐黑色, 其余大部红棕色, 中线黑色, 自中室内斜, 至 1 脉后折向内, 外线黑色, 自前缘脉外斜, 至 6 脉成一尖角, 在 4 脉成一钝外突角, 其后弧形绕至 3 脉基部, 线内侧褐黑色, 在 4—7 脉间有黑色波曲线, 端区有不清晰的黑色碎纹, 翅脉棕红色, 近外缘有一黑色细线; 后翅暗褐色, 缘毛淡赭黄色; 腹部黄褐带灰色。