

下角至翅后缘，后部靠近内线，外线白色，内侧衬棕色，细锯齿形，自前缘脉外斜至7脉折向后，在中褶处内凸，其后外弯，在亚中褶处内弯，至1脉外凸，中、外线间较均匀带有紫红色，亚端线黑棕色，在7脉处外凸，中段外弯，翅外缘前半凹陷，使顶角稍显外突；后翅白色带红色；腹部灰色，背面带紫红色。

分布 海南；缅甸，新加坡。

贝夜蛾属 *Beara* Walker

Beara Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1703.

Type-species: *Beara dichromella* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，端部饰毛，第三节向前伸，复眼大，额光滑无突起；雄蛾触角双栉形或线形；胸部被毛和鳞片，前胸有散开型毛簇；前翅前缘基半部拱曲，有一极小副室；后翅3、4脉共一短柄，5脉发达，自中室下角发出；腹部基节背面有毛簇。

云贝夜蛾 *Beara nubiferella* Walker (图版XXXIX-18)

Beara nubiferella Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1704. (爪哇)

Beara nubiferella: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 582, pl. 189, fig. 20. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 444. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 323.

翅展19 mm。头部与胸部褐色，带有紫灰色，下胸与足白色，前足与中足胫节及跗节带褐色；前翅褐色带紫灰色，布有黑色细点，基线只现一黑色内斜纹，位于前缘区，内线黑棕色，中段外弯，中室端部有一暗褐色小圈或一长点，外线暗褐色，自前缘脉后外弯，在中褶处稍内凸，4脉后明显内弯，前端外侧色稍黑，似成三角形斑，亚端线黑色，前半曲折，后半外弯至亚中褶端部，端线黑色，不达臀角，缘毛基部有一白线；后翅灰白色，向外渐带紫褐色，顶角区色较浓；腹部白色，背面带浅褐色。

分布 广东、云南；印度，马来西亚，印度尼西亚。

霜夜蛾属 *Gelastocera* Butler

Gelastocera Butler, 1877, Ann. Mag. nat. Hist. 4, 20: 476.

Type-species: *Gelastocera exusta* Butler.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，后缘端部微有毛，第三节中常，向前伸，额平滑，有毛簇，复眼圆大，雄蛾触角双栉形，2/3有长分枝，端部线形；胸部毛