

分布 福建、江西；马来西亚。

靛夜蛾属 *Belciana* Walker

Belciana Walker, 1862, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 6: 182.

Type-species: *Dandaca biformis* Walker.

Nalca Walker, 1866. List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1983.

Dipheroides Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 203.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长，触角线形；胸部被平滑鳞片；前翅较宽，顶角稍尖；后翅宽；腹部较短。

种 检 索 表

- 前翅仅中线明显 靛夜蛾 *Belciana biformis*
 前翅各横线明显 新靛夜蛾 *B. staudingeri*

靛夜蛾 *Belciana biformis* (Walker) (图版 LIX - 19)

Dandaca biformis Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1761. (Sarawak)

Pandesma hemodi Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 111, fig. 25.

Polydesma biformis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 971.

Belciana biformis: Barlow, 1982, Moths S. E. Asia p. 108, pl. 37, fig. 4.

翅展 43 mm。头部褐色，头顶绿色；胸部背面绿色，颈板基部褐色；前翅白色带绿色，基线为一黑褐斑，自前缘脉至亚中褶，其内缘中部外弯，外缘在中室后强内斜，此斑在中室处色浅或间断，前缘脉基部有一黑褐点，中室有一不清晰白斑，中线黑褐色，自前缘脉微曲外斜至 4 脉折角内斜，在前缘脉上为小斑状，在 2 脉处内凸成一齿，外线不清晰，白色，由新月形纹组成，自前缘脉微曲后行至 5 脉处外斜至亚端区，4 脉后内斜并明显间断，线外侧有一列黑点，外方在 4 脉前红褐色，成一近方形大斑，亚中褐端部有一红褐斑，端线由一系列新月形黑褐点组成，缘毛绿色间褐色；后翅黄褐色，隐约可见褐色微波曲中线与外线，端区有一黑褐宽带，其内缘波曲，端线黑褐色，波浪形，缘毛浅褐黄色，中有一模糊暗褐线；腹部浅褐色，背面带绿色。

分布 海南；泰国，印度，斯里兰卡，马来西亚。

新靛夜蛾 *Belciana staudingeri* (Leech) (图版 LIX - 20)

Polydesma staudingeri Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 551. (朝鲜)

Daseochaeta trinubila Draudt, 1937, Ent. Rdsch. 54: 374, pl. 4, fig. 3a.

Belciana staudingeri: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 368. —Kozhantschikov,