

部灰白色，胫距基部与端部灰白色，跗节外侧褐黑色，各节间有灰白斑；前翅棕褐色，内线双线黑色，自前缘脉后折角直线内斜，外一线细弱，环纹只现一黑点，中线黑色内斜，内线与中线间白色，成一宽带，肾纹白色，窄曲，围以黑边，外线双线黑色，自前缘脉外弯，波浪形，至4脉后绕过肾纹后端并呈锯齿形，在2脉基部后呈直线内斜，与中线贴近，外线前后段的双线间白色，亚端线隐约可见白色，不规则弯曲并稍间断，前端外侧有一黑斑，斑外侧衬淡褐白色，此处缘毛同色，翅外缘有一列黑点；后翅灰褐色，外线与亚端线均只在亚中褶及1脉后明显，黄白色，两侧衬黑色，缘毛基部有一浅黄线；腹部灰棕色，基节背面淡黄色，各节间有黑线。

分布 福建、海南、四川、云南；锡金。

黑带拟胸须夜蛾 *Bertula abjudicalis* Walker (图版 LXVIII-7)

Bertula abjudicalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 163. (斯里兰卡)

Bertula thyrissalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 167.

Bertula tumidalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 176.

Bertula abjudicalis: Hampson, 1893, Ill. Lep. Het. 9: 128. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425, pl. 75b.

Bleptina abjudicalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 44, fig. 20.

翅展 26 mm。头部暗红褐色，雄蛾触角线形，有长纤毛，下唇须长，上弯如镰状，其端部达后胸，第三节端部灰色，腹缘饰较长毛，胸部褐色，足跗节各节间有赭白斑；前翅内线内方深褐色，内线双线黑褐色，微曲内斜，环纹只现一黑点，肾纹白色，细窄，黑边，中线模糊，黑褐色，约呈带状，外线双线黑色，自前缘脉微内斜，在中褶处内凸，其后外斜，在3、4脉处呈锯齿形，其后强内弯，至2脉基部后内斜，外线与内线之间大部黄白色，外半带有赭色，亚端线赭黄色，不规则锯齿形，在3、4脉处为较强外凸齿，外线外侧与亚端线外侧均衬较宽的黑褐色，翅外缘有一列新月形黑点，其外侧均衬赭黄色，缘毛暗褐色，中有一赭黄色线，有间断；后翅暗灰褐色，外线与亚端线浅赭黄色，两侧衬黑褐色，微波曲，前半不明显，端线由一系列黑色曲纹组成，缘毛暗褐色，基部有一浅黄波曲线；腹部黑褐色，2、3节背面大部赭白色，其余各节间带浅赭黄色。

分布 四川；锡金，印度，斯里兰卡，澳大利亚。

疽夜蛾属 *Nodaria* Guenée

Nodaria Guenée, 1854, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 8: 63.

Type-species: *Nodaria hispanalis* Guenée.