

双拟胸须夜蛾 *Bertula bistrigata* (Staudinger) (图版 LXVIII-4)

Zanclognatha bistrigata Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 276. (符拉迪沃斯托克 (海参崴))

Bleptina bistrigata: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 625.

Bocana bistrigata: Draeseke, 1928, Dt. ent. Z. Iris, 42: 318. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 145.

Bertula bistrigata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423.

Bertula bistrigata: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 923.

翅展 26 mm。头部暗灰棕色带紫色，下唇须暗褐色斜向上伸，第二节背缘饰浓密鳞毛；胸部背面暗灰棕色带紫色，足外侧黑褐色，跗节各节间有白斑；前翅暗棕色带紫灰色，亚端线外方色较灰，内线黄白色，直线内斜，较粗，肾纹小，黄白色，边缘微呈锯齿形，外线黄白色，直线后垂，自前缘脉稍外斜，中褶后较直内斜，亚端线不明显，白色，前缘脉至 9 脉间较粗，在 7、8 脉处二曲形，在 4 脉处外凸成一齿，其后内弯，后端达臀角；后翅暗棕色带灰色。

分布 黑龙江、福建；朝鲜；日本，俄罗斯。

异拟胸须夜蛾 *Bertula hisbonalis* Walker (图版 LXVIII-5)

Bertula hisbonalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 164. (Bengal)

Bleptina hisbonalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 45.

Bertula hisbonalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 426, pl. 75k. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1037.

翅展 40 mm。头部紫褐色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须长，向上伸并向后弯达胸部背面，第二、三节有长毛簇；胸部紫褐色，足胫节外侧黑褐色；前翅紫褐色，肾纹小，黄白色，长点状，前后端尖，亚端线黑褐色，自顶角直线内斜至翅后缘，线外方色浅；后翅紫褐色，亚端线黑褐色，自前缘直线内斜，线外方色浅；腹部紫褐色。

分布 湖北、湖南、福建、海南；日本，孟加拉国。

锯拟胸须夜蛾 *Bertula dentilinea* (Hampson) (图版 LXVIII-6)

Bleptina (Bertula) dentilinea Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 45. (锡金)

Bertula dentilinea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425. —Chu, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 146. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383.

翅展 34 mm。头部棕色，下唇须向上伸，超过头顶，第二节后侧有小毛簇，第三节扁，端部尖，灰白色，前半部有三角形毛簇；胸部背面棕色，足外侧红褐色，胫节端

部灰白色，胫距基部与端部灰白色，跗节外侧褐黑色，各节间有灰白斑；前翅棕褐色，内线双线黑色，自前缘脉后折角直线内斜，外一线细弱，环纹只现一黑点，中线黑色内斜，内线与中线间白色，成一宽带，肾纹白色，窄曲，围以黑边，外线双线黑色，自前缘脉外弯，波浪形，至4脉后绕过肾纹后端并呈锯齿形，在2脉基部后呈直线内斜，与中线贴近，外线前后段的双线间白色，亚端线隐约可见白色，不规则弯曲并稍间断，前端外侧有一黑斑，斑外侧衬淡褐白色，此处缘毛同色，翅外缘有一列黑点；后翅灰褐色，外线与亚端线均只在亚中褶及1脉后明显，黄白色，两侧衬黑色，缘毛基部有一浅黄线；腹部灰棕色，基节背面淡黄色，各节间有黑线。

分布 福建、海南、四川、云南；锡金。

黑带拟胸须夜蛾 *Bertula abjudicalis* Walker (图版 LXVIII-7)

Bertula abjudicalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 163. (斯里兰卡)

Bertula thyrissalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 167.

Bertula tumidalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 176.

Bertula abjudicalis: Hampson, 1893, Ill. Lep. Het. 9: 128. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425, pl. 75b.

Bleptina abjudicalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 44, fig. 20.

翅展 26 mm。头部暗红褐色，雄蛾触角线形，有长纤毛，下唇须长，上弯如镰状，其端部达后胸，第三节端部灰色，腹缘饰较长毛，胸部褐色，足跗节各节间有赭白斑；前翅内线内方深褐色，内线双线黑褐色，微曲内斜，环纹只现一黑点，肾纹白色，细窄，黑边，中线模糊，黑褐色，约呈带状，外线双线黑色，自前缘脉微内斜，在中褶处内凸，其后外斜，在3、4脉处呈锯齿形，其后强内弯，至2脉基部后内斜，外线与内线之间大部黄白色，外半带有赭色，亚端线赭黄色，不规则锯齿形，在3、4脉处为较强外凸齿，外线外侧与亚端线外侧均衬较宽的黑褐色，翅外缘有一列新月形黑点，其外侧均衬赭黄色，缘毛暗褐色，中有一赭黄色线，有间断；后翅暗灰褐色，外线与亚端线浅赭黄色，两侧衬黑褐色，微波曲，前半不明显，端线由一系列黑色曲纹组成，缘毛暗褐色，基部有一浅黄波曲线；腹部黑褐色，2、3节背面大部赭白色，其余各节间带浅赭黄色。

分布 四川；锡金，印度，斯里兰卡，澳大利亚。

疽夜蛾属 *Nodaria* Guenée

Nodaria Guenée, 1854, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 8: 63.

Type-species: *Nodaria hispanalis* Guenée.