

双拟胸须夜蛾 *Bertula bistrigata* (Staudinger) (图版 LXVIII-4)

Zanclognatha bistrigata Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 276. (符拉迪沃斯托克 (海参崴))

Bleptina bistrigata: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 625.

Bocana bistrigata: Draeseke, 1928, Dt. ent. Z. Iris, 42: 318. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 145.

Bertula bistrigata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423.

Bertula bistrigata: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 923.

翅展 26 mm。头部暗灰棕色带紫色，下唇须暗褐色斜向上伸，第二节背缘饰浓密鳞毛；胸部背面暗灰棕色带紫色，足外侧黑褐色，跗节各节间有白斑；前翅暗棕色带紫灰色，亚端线外方色较灰，内线黄白色，直线内斜，较粗，肾纹小，黄白色，边缘微呈锯齿形，外线黄白色，直线后垂，自前缘脉稍外斜，中褶后较直内斜，亚端线不明显，白色，前缘脉至 9 脉间较粗，在 7、8 脉处二曲形，在 4 脉处外凸成一齿，其后内弯，后端达臀角；后翅暗棕色带灰色。

分布 黑龙江、福建；朝鲜；日本，俄罗斯。

异拟胸须夜蛾 *Bertula hisbonalis* Walker (图版 LXVIII-5)

Bertula hisbonalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 164. (Bengal)

Bleptina hisbonalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 45.

Bertula hisbonalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 426, pl. 75k. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1037.

翅展 40 mm。头部紫褐色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须长，向上伸并向后弯达胸部背面，第二、三节有长毛簇；胸部紫褐色，足胫节外侧黑褐色；前翅紫褐色，肾纹小，黄白色，长点状，前后端尖，亚端线黑褐色，自顶角直线内斜至翅后缘，线外方色浅；后翅紫褐色，亚端线黑褐色，自前缘直线内斜，线外方色浅；腹部紫褐色。

分布 湖北、湖南、福建、海南；日本，孟加拉国。

锯拟胸须夜蛾 *Bertula dentilinea* (Hampson) (图版 LXVIII-6)

Bleptina (Bertula) dentilinea Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 45. (锡金)

Bertula dentilinea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425. —Chu, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 146. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383.

翅展 34 mm。头部棕色，下唇须向上伸，超过头顶，第二节后侧有小毛簇，第三节扁，端部尖，灰白色，前半部有三角形毛簇；胸部背面棕色，足外侧红褐色，胫节端