

Bleptina spacoalis: Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 565. —Herz. 1905, Ezheg. zool. Mus., p. 322.

Bocana spacoalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423, pl. 72h, g. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1036.

Bertula spacoalis: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 923.




图 693 条拟胸须夜蛾 *Bertula spacoalis*
(Walker) ♂ 外生殖器

翅展 28 mm。头部褐色，下唇须长，向上伸，弯过头顶，第三节细，基部与端部白色，端部尖；胸部背面褐色，跗节浅黄灰色，前足跗节色较褐；前翅褐色，内线黄白色，微曲内斜，前半较粗，外线黄白色，大波浪形，在中室端部内凹与肾纹合二而一，亚端线不明显，在前缘区现一小白斑，端区色稍浅；后翅褐色，外线黄白色，在中室前不明显，亚端线黄白色，不明显；腹部褐色。雄蛾抱器瓣端尖，腹侧端部一膜质短突（图 693）。

分布 河北、湖南、江西、福建、四川；日本。

波拟胸须夜蛾 *Bertula sinuosa* (Leech) (图版 LXVIII-3)

Bleptina sinuosa Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 622. (湖北长阳)

Bleptina sinuosa: Draeseke, 1928, Dt. ent. Z. Iris, 42: 318. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 424, pl. 741. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.371.

Bertula sinuosa: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 922.

翅展 25 mm。头部与胸部暗褐色；前翅黄褐色，外线外方褐色，内线内方色亦较暗，内线暗褐色，波曲，在中室后明显外弯，曲度与内方暗褐区外缘相似，环纹只现一黑褐点，中线暗褐色，粗而模糊，自前缘脉二曲形至中室后缘，微折角内弯，肾纹细窄，暗褐色，后部明显，外线双线暗褐色，内一线细弱，稍间断，自前缘脉微外斜，在中褶处稍内凹，其后外弯，3脉后强内弯，亚端线浅褐黄色，不规则波浪形，曲度与外线相似，但波浪形明显，翅外缘有一列新月形黑褐点，缘毛暗褐色杂浅褐黄色，基部有一黄白线；后翅黑褐色，中线黑褐色，外线与亚端线均褐黄色，波浪形，曲度亦相似，两线内侧均衬暗褐色，翅外缘有一列新月形暗褐点；腹部褐色。

分布 湖北、四川、西藏；日本。

双拟胸须夜蛾 *Bertula bistrigata* (Staudinger) (图版 LXVIII-4)

Zanclognatha bistrigata Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 276. (符拉迪沃斯托克 (海参崴))

Bleptina bistrigata: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 625.

Bocana bistrigata: Draeseke, 1928, Dt. ent. Z. Iris, 42: 318. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 145.

Bertula bistrigata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423.

Bertula bistrigata: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 923.

翅展 26 mm。头部暗灰棕色带紫色，下唇须暗褐色斜向上伸，第二节背缘饰浓密鳞毛；胸部背面暗灰棕色带紫色，足外侧黑褐色，跗节各节间有白斑；前翅暗棕色带紫灰色，亚端线外方色较灰，内线黄白色，直线内斜，较粗，肾纹小，黄白色，边缘微呈锯齿形，外线黄白色，直线后垂，自前缘脉稍外斜，中褶后较直内斜，亚端线不明显，白色，前缘脉至 9 脉间较粗，在 7、8 脉处二曲形，在 4 脉处外凸成一齿，其后内弯，后端达臀角；后翅暗棕色带灰色。

分布 黑龙江、福建；朝鲜；日本，俄罗斯。

异拟胸须夜蛾 *Bertula hisbonalis* Walker (图版 LXVIII-5)

Bertula hisbonalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 164. (Bengal)

Bleptina hisbonalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 45.

Bertula hisbonalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 426, pl. 75k. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1037.

翅展 40 mm。头部紫褐色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须长，向上伸并向后弯达胸部背面，第二、三节有长毛簇；胸部紫褐色，足胫节外侧黑褐色；前翅紫褐色，肾纹小，黄白色，长点状，前后端尖，亚端线黑褐色，自顶角直线内斜至翅后缘，线外方色浅；后翅紫褐色，亚端线黑褐色，自前缘直线内斜，线外方色浅；腹部紫褐色。

分布 湖北、湖南、福建、海南；日本，孟加拉国。

锯拟胸须夜蛾 *Bertula dentilinea* (Hampson) (图版 LXVIII-6)

Bleptina (*Bertula*) *dentilinea* Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 45. (锡金)

Bertula dentilinea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425. —Chu, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 146. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383.

翅展 34 mm。头部棕色，下唇须向上伸，超过头顶，第二节后侧有小毛簇，第三节扁，端部尖，灰白色，前半部有三角形毛簇；胸部背面棕色，足外侧红褐色，胫节端