

p.1037.

翅展 37 mm。头部黑棕色杂少许浅褐色，下唇须向上弯，浅赭黄色杂少许黑褐色；胸部黑棕色杂淡褐色，足胫节外侧褐黑色，端部浅赭黄色，跗节黑色，各节间有赭黄斑；前翅灰色，密布黑棕细点，内线黄白色，外侧衬黑褐色，微波曲内斜，肾纹黑色杂有黄白色，中部凹，使似呈二黑点，外线黄白色，外侧衬黑色，近呈直线内斜，与内行近平行，亚端线不清晰，黄白色，锯齿形，在中褶处内凹，2—4 脉间外凸，中段两侧有模糊黑点，端线由一系列三角形黑点组成，外线外方区域色暗褐；后翅灰色，布有黑棕细点，外线黄白色，外侧衬黑褐色，在 1 脉后稍折向内斜，前段较弱，外线外方区域杂有暗褐色模糊点纹，端线由一系列黑色三角形点组成；腹部背面黑棕色，基部灰色。

分布 浙江、湖南、江西、福建、海南、四川。

拟胸须夜蛾属 *Bertula* Walker

Bertula Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 162.

Type-species: *Bertula abjudicalis* Walker.

Neviasca Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 7.

Cardalena Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 19: 888.

Gabrisa Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1174.

喙发达，下唇须向上伸，雄蛾下唇须镰刀形，弯到胸背中部，第二节前缘有毛，第二、三节后缘有长毛簇；前足胫节无鞘；前翅前缘脉间向下有一褶，起翅缰钩作用。

种 检 索 表

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. 前翅窄 | 2 |
| 前翅中常 | 3 |
| 2. 前翅亚端线自顶角内斜 | 条拟胸须夜蛾 <i>Bertula spacoalis</i> |
| 前翅亚端线不达顶角 | 波拟胸须夜蛾 <i>B. sinuosa</i> |
| 3. 前翅内、外线白色 | 双拟胸须夜蛾 <i>B. bistrigata</i> |
| 前翅内、外线非白色 | 4 |
| 4. 前翅内线外侧有一白带 | 5 |
| 前翅内线外侧无白带 | 异拟胸须夜蛾 <i>B. hisbonalis</i> |
| 5. 白带宽 | 锯拟胸须夜蛾 <i>B. dentilinea</i> |
| 白带窄 | 黑带拟胸须夜蛾 <i>B. abjudicalis</i> |

条拟胸须夜蛾 *Bertula spacoalis* (Walker) (图版 LXVIII-2)

Bleptina spacoalis Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 19: 872. (华北)

Bleptina spacoalis: Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 565. —Herz. 1905, Ezheg. zool. Mus., p. 322.

Bocana spacoalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423, pl. 72h, g. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1036.

Bertula spacoalis: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 923.




图 693 条拟胸须夜蛾 *Bertula spacoalis*
(Walker) ♂ 外生殖器

翅展 28 mm。头部褐色，下唇须长，向上伸，弯过头顶，第三节细，基部与端部白色，端部尖；胸部背面褐色，跗节浅黄灰色，前足跗节色较褐；前翅褐色，内线黄白色，微曲内斜，前半较粗，外线黄白色，大波浪形，在中室端部内凹与肾纹合二而一，亚端线不明显，在前缘区现一小白斑，端区色稍浅；后翅褐色，外线黄白色，在中室前不明显，亚端线黄白色，不明显；腹部褐色。雄蛾抱器瓣端尖，腹侧端部一膜质短突（图 693）。

分布 河北、湖南、江西、福建、四川；日本。

波拟胸须夜蛾 *Bertula sinuosa* (Leech) (图版 LXVIII-3)

Bleptina sinuosa Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 622. (湖北长阳)

Bleptina sinuosa: Draeseke, 1928, Dt. ent. Z. Iris, 42: 318. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 424, pl. 741. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.371.

Bertula sinuosa: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 922.

翅展 25 mm。头部与胸部暗褐色；前翅黄褐色，外线外方褐色，内线内方色亦较暗，内线暗褐色，波曲，在中室后明显外弯，曲度与内方暗褐区外缘相似，环纹只现一黑褐点，中线暗褐色，粗而模糊，自前缘脉二曲形至中室后缘，微折角内弯，肾纹细窄，暗褐色，后部明显，外线双线暗褐色，内一线细弱，稍间断，自前缘脉微外斜，在中褶处稍内凹，其后外弯，3脉后强内弯，亚端线浅褐黄色，不规则波浪形，曲度与外线相似，但波浪形明显，翅外缘有一列新月形黑褐点，缘毛暗褐色杂浅褐黄色，基部有一黄白线；后翅黑褐色，中线黑褐色，外线与亚端线均褐黄色，波浪形，曲度亦相似，两线内侧均衬暗褐色，翅外缘有一列新月形暗褐点；腹部褐色。

分布 湖北、四川、西藏；日本。