

Blenina senex: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 407. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 292. —Mell, 1943, Zool. Jb. 76: 204. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 340. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 793.

翅展 40—48mm。头、胸及前翅灰绿杂白色；前翅基线、内线及外线黑色，内线波浪形，外线后半锯齿形，中室有黑竖鳞组成的二黑点，外区前缘脉有一列黑点，亚端线白色波浪形，内侧衬白色，亚中褶处一黑纹，端线褐色；后翅褐色，端区黑褐色，中线暗褐色；腹部浅褐色。雄蛾抱器瓣宽，抱钩长弯，阳茎细小（图 595）。

寄主 柿。

分布 江苏、浙江、湖南、江西、福建、海南、广西、四川、云南；日本。




图 595 柿癭皮夜蛾 *Blenina senex* (Butler) ♂ 外生殖器

枫杨癭皮夜蛾 *Blenina quinaria* Moore (图版 XLV-14)

Blenina quinaria Moore, 1882, Lep. Atk. p. 158, pl. 5, fig. 5. (大吉岭)

Blenina quinaria: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 410. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 408. —Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 21. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 340.




图 596 枫杨癭皮夜蛾 *Blenina quinaria* Moore ♂ 外生殖器

翅展 34—44mm。头、胸白色带黑绿色，额有黑斑；前翅白色带褐色，布有暗绿细

点，外区有黄褐细点，后缘区中段乳黄色，各横线黑色，内、外线不明显，外线前半锯齿形，亚端线波浪形，肾纹黑色，前方一黑斜纹，翅外缘一列黑点；后翅黄褐色，端区黑褐色，有一褐色中带；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣简单，阳茎细小（图 596）。

寄主 枫杨。

分布 陕西、安徽、浙江、湖南、江西、海南、四川、云南、西藏；印度。

长角皮夜蛾属 *Risoba* Moore

Risoba Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 328.

Type-species: *Thyatira repugnans* Walker.

Pitrassa Moore, 1882, Lep. Atk. p. 94.

Lycoselene Moschler, 1887, Abh. senckenb. nat. Ges. 15: 87.

喙发达，下唇须向上伸，第二节伸达头顶，适度被鳞，第三节长度适中，前伸；额平滑；复眼圆大；触角长度与前翅相等，雄蛾触角大部分线形。胸部被鳞片并混有毛，后胸具散开的毛簇。足胫节具长毛。雄蛾腹部较长，中部具小的背毛簇，腹端毛簇分开。前翅顶角钝，外缘曲度平稳，微波状。

种 检 索 表

1. 前翅顶角一红褐斑 长角皮夜蛾 *Risoba repugnans*
前翅顶角无红褐斑 2
2. 前翅中脉前有白纹 前白长角皮夜蛾 *R. diversipennis*
前翅中脉前无白纹 3
3. 前翅外线内侧有一白色窄带 4
前翅外线内侧无白带 基白长角皮夜蛾 *R. basalis*
4. 环纹为一暗褐点，肾纹为一红褐点 文长角皮夜蛾 *R. literata*
无环纹，肾纹白色 显长角皮夜蛾 *R. prominens*

长角皮夜蛾 *Risoba repugnans* (Walker) (图版 XIV-15)

Thyatira repugnans Walker, 1856, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 9: 9. (斯里兰卡)

Risoba repugnans: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 1, pl. 144, fig. 1. —Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 398. —Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 426. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 411, pl. 39c.

翅展 31mm。头部灰色杂少许褐色，额有黑纹；胸部黄白带浅红褐色；前翅绿灰色，密布黑褐细点，基部一白斑，其外缘为一黑线，波曲外斜，斑内有红棕色，斑外侧黑棕色，肾纹橙色黑褐边，中央褐色，外线褐色，后半锯齿形，在翅脉上为楔形纹，外