

毛簇黑色。

分布 海南；印度，斯里兰卡。

瘿皮夜蛾属 *Blenina* Walker

Blenina Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1178, 1214.

Type-species: *Blenina accipiens* Walker.

Eliocroea Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 935.

Amrella Moore, 1882, Lep. Atk. p. 158.

喙发达，下髯须向上伸，第二节达头顶，鳞片细长，第三节中常，有些端部比较宽，额平滑，上方有毛成脊状；雄蛾触角有纤毛；胸部几乎全为鳞片，前胸无毛簇，后胸有扁形毛簇，胫节有毛；腹部基部两节有毛簇；前翅顶角稍钝，外缘曲度平稳，微呈锯齿形，前翅翅脉 3 及 4 从中室下角伸出，6 脉从中室顶角伸出，副室狭长，11 脉自中室伸出；后翅 2 脉自中室下角前方伸出。

种 检 索 表

- 1. 雄蛾下唇须第二节端部前缘凹…………… 绿瘿皮夜蛾 *Blenina chlorophila*
雄蛾下唇须正常…………… 2
- 2. 前翅外缘半凹…………… 柿瘿皮夜蛾 *B. senex*
前翅外缘曲度平稳…………… 枫杨瘿皮夜蛾 *B. quinaria*

绿瘿皮夜蛾 *Blenina chlorophila* Hampson (图版 XLV-12)

Blenina chlorophila Hampson, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 16: 546. (新加坡)

Blenina chlorophila: Hampson, 1912, Car. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 402, pl. 185, fig.

2. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 407. Holloway, 1976, Moths Borneo p.21.

翅展 42mm。头、胸深绿杂白色，颈板与翅基片端部黑色，额有黑横条；前翅底色白，大部带深绿色并布有细黑点，后缘区基部棕色，1 脉前有一黑曲线，各横线黑色，基线波浪形，内线双线波浪形，中线、外线双线锯齿形，肾纹为一黑短条，亚端线不规则锯齿形，内侧有黑斑，顶角一内斜黑影，一黑影自亚端线 6、7 脉间外斜至翅外缘中部，各翅脉端有一黑点；后翅黑褐色，端区近黑色。外线橙色带状，亚中褶端部一橙色短纹；腹部背面黑褐色。

分布 台湾、广东、海南；印度，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚，新加坡。

柿瘿皮夜蛾 *Blenina senex* (Butler) (图版 XLV-13)

Dandaca senex Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5; 1: 82. (日本横滨)

Blenina senex: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 407. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 292. —Mell, 1943, Zool. Jb. 76: 204. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 340. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 793.

翅展 40—48mm。头、胸及前翅灰绿杂白色；前翅基线、内线及外线黑色，内线波浪形，外线后半锯齿形，中室有黑竖鳞组成的二黑点，外区前缘脉有一列黑点，亚端线白色波浪形，内侧衬白色，亚中褶处一黑纹，端线褐色；后翅褐色，端区黑褐色，中线暗褐色；腹部浅褐色。雄蛾抱器瓣宽，抱钩长弯，阳茎细小（图 595）。

寄主 柿。

分布 江苏、浙江、湖南、江西、福建、海南、广西、四川、云南；日本。




图 595 柿癭皮夜蛾 *Blenina senex* (Butler) ♂ 外生殖器

枫杨癭皮夜蛾 *Blenina quinaria* Moore (图版 XLV-14)

Blenina quinaria Moore, 1882, Lep. Atk. p. 158, pl. 5, fig. 5. (大吉岭)

Blenina quinaria: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 410. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 408. —Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 21. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 340.




图 596 枫杨癭皮夜蛾 *Blenina quinaria* Moore ♂ 外生殖器

翅展 34—44mm。头、胸白色带黑绿色，额有黑斑；前翅白色带褐色，布有暗绿细