

焦毛眼夜蛾 *Blepharita adusta* (Esper) (图版 XXV-3)

Phalaena Noctua adusta Esper, 1790, Schmett. 4, pl. 149, figs. 1, 2. (德国)

Eumichtis adusta: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 329. —Kostrowicki, 1956, Pol. ent. Soc. 27: 54.

Mniotype adusta: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 315.

Blepharita adusta: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 204.




图 439 焦毛眼夜蛾 *Blepharita adusta* (Esper) ♂ 外生殖器

翅展 42mm。头、胸、前翅暗褐杂灰色，前翅亚中褶基部一黑纹，基线、内线均双线黑色，后者波浪形，后端内侧一黑纹，剑纹长，外端一黑纹外伸至外线，环纹、肾纹褐色，后者外缘锯齿形，外线双线锯齿形，外一线间断为黑、白点，亚端线灰白色锯齿形，内侧一列黑纹；后翅白色；腹部暗褐色。雄蛾抱钩长棘形（图 439）。

寄主 柳、杨梅、桤木属。

分布 黑龙江、青海、新疆、西藏；亚洲西部，欧洲。

斜纹毛眼夜蛾 *Blepharita remota* (Püngeler) (图版 XXV-4)

Hadena remota Püngeler, (=1900), 1899, Iris 12: 294, pl. 9, fig. 19. (青海湖区)

Rhizotype remota: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 376.

Stenostigma remota: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 138. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 111.

翅展 42mm。头、胸、前翅浅褐杂灰黄色，前翅亚中褶基部一黑纹，基线、内线前段均双线黑色，剑纹后有黑线伸至外线，环纹及肾纹大，褐色，后者前方一黑纹，外线