

不明显，黄白色，在7脉前外突，中段外弯，翅外缘有一列新月形黑纹；后翅白色，隐约可见褐黑色外线与亚端线，翅脉纹微黑，端线黑色；腹部灰色，端部背面色暗。

分布 陕西、浙江。

德毛眼夜蛾 *Blepharita draudti* Boursin (图版 XXV-8)

Blepharita draudti Boursin, 1952, Z. wien. ent. Ges. 37: 136. (云南德钦)

Maganephria adusta, Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 66, pl. 4, fig. 25.

翅展42mm。头、胸、腹褐色；前翅灰色微褐，中区带黑褐色，基线、内线及外线均双线黑色，基线波浪形，外线锯齿形，亚中褶基部一黑纹，剑纹端部外伸一黑纹达外线，环纹、肾纹灰白色，中线黑色锯齿形，外线前后段的双线间白色，线外侧的1脉前有一黑纹，亚端线褐黄色波浪形，内侧一列黑褐纹；后翅白色带灰褐色，外线、亚端线黑褐色。

分布 云南。

白斑毛眼夜蛾 *Blepharita niveiplaga* (Walker) (图版 XXV-9)

Hadena niveiplaga Walker, 1857, List. Spec. Ins. Colln Br. Mus. 11: 593. (印度)

Trachea niveiplaga: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 204. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.978.

Blepharita niveiplaga: Boursin, 1964, Veroff. zool. StSamml. Munch. 8: 33.

翅展43mm。头、胸、腹及前翅褐色，后翅黑褐色。前翅基线、内线及外线均双线黑褐色，基、内线波浪形，外线锯齿形，剑纹、环纹及肾纹褐色黑边，肾纹外有一白点，其后有二小白点，中线黑色波浪形，外线的齿尖为黑、白点，亚端线灰色锯齿形，内侧一列黑齿纹。

分布 湖南；印度，巴基斯坦。

齐毛眼夜蛾 *Blepharita concinna* (Leech) (图版 XXV-10)

Apamea concinna Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 61. (中国西部: Wa-ssu-kow)

Eumichtis cocinna: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 516, pl. 108, fig. 7.

Dryobotodes concinna: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 134, pl. 32h.

翅展40mm。头、胸及前翅黄绿色，颈板有一黑线，前翅亚中褶基部一黑纹，基线、内线均双线黑色波浪形，剑纹端部尖，环纹斜圆，肾纹大，中线及外线黑色锯齿形；后者双线，内线、外线间大部带黑褐色，此间亚中褶另一黑纵条，亚端线黄绿色，内侧衬黑色，中段锯齿形；后翅浅灰微带黑褐色，外线、亚端线细，黑褐色；腹部暗灰色。

分布 云南。