

- 9. 后翅黄白色 褐灰毛眼夜蛾 *B. petrolignea*
后翅褐色 长线毛眼夜蛾 *B. longilinea*
- 10. 前翅 2 脉一白齿纹 黄绿毛眼夜蛾 *B. praetermissa*
前翅 2 脉无白齿纹 11
- 11. 前翅亚端区一黑斑 德毛眼夜蛾 *B. draudti*
前翅亚端区无黑斑 12
- 12. 肾纹有 3 个白点 白斑毛眼夜蛾 *B. niveiplaga*
肾纹无白点 13
- 13. 前翅带绿色 齐毛眼夜蛾 *B. concinna*
前翅不带绿色 犹毛眼夜蛾 *B. euplexina*

毛眼夜蛾东北亚种 *Blepharita amica ussuriensis* Sheljuzhko (图版 XXIV-33)

Hadena amica Treitschke, 1825, Eur. Schmett. Eur. 5 (1): 332.
Blepharita amica ssp. *ussuriensis* Sheljuzhko, 1919, Neue Beitr. Syst. Ins. 1: 132. (乌苏里)
Blepharita amica ussuriensis: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 92.
Blepharita amica: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 281.

翅展 52mm。头部与胸部红棕色，颈板有暗棕色纹；前翅红棕色，基线双线褐色，内线双线黑棕色，线间白色，波浪形稍外斜，环纹斜圆形，白色，中央褐色，边缘黑褐色，肾纹白色，中有褐圈，外线双线黑棕色，线间白色，自前缘脉外斜至 6 脉后内斜，前半锯齿形，后半较平稳，亚端线白色，在 7 脉处外凸，在 3、4 脉处为外凸齿，两侧深棕色；后翅褐灰色；腹部黄棕色。

寄主 乌头属、稠李。
分布 辽宁；俄罗斯。
前翅色较指名亚种偏红，后翅不带黑褐色。

褐毛眼夜蛾 *Blepharita magnirena* (Alpheraky) (图版 XXIV-34)

Hadena magnirena Alpheraky, 1892, Mem. Lep. 6: 36. (甘肃)
Eumichtis magnirena: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 325.
Mniotype magnirena: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 315.

翅展 43mm。头、胸赤褐杂少许灰及黑褐色；前翅灰黄带赤褐色，亚中褶基部一黑纵线，基线、内线及外线均双线黑色，内线波浪形，外线锯齿形，线间灰黄色，剑纹黑边，环纹斜圆形，肾纹外缘锯齿形，亚端线灰黄色，前半段锯齿形，3、4 脉处为外突齿；后翅浅红褐色；腹部浅褐色。

分布 甘肃、青海、云南、西藏。