

紫褐毛眼夜蛾 *Blepharita melanodonta* (Hampson) (图版 XXIV-35)

Eumichtis melanodonta Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 327. pl. 134. fig. 6.
(日本)

Crino melanodonta: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 131.

Meganephria melanodonta: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 736.

翅展 46mm。头部褐色；胸部红褐杂黑色及少许灰色；前翅紫褐杂灰白色，部分带褐色，翅脉黑褐色，亚中褶基部一黑曲纹，其后另一黑纹，基线仅前端现二黑纹，内线、外线均双线黑褐色，剑纹大，环纹、肾纹外围褐白色，中色褐色，外区亚中褶一黄白纹，亚端线浅褐色，内侧一列齿形黑斑，外侧一列黑纹；后翅褐色；腹部红褐色。

分布 黑龙江；日本。

樱毛眼夜蛾 *Blepharita satura* (Denis et Schiffermüller) (图版 XXV-1)

Noctua satura [Denis et Schiffermüller], 1776, Wien. Verz. p. 83. (奥地利)

Eumichtis satura: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 327.

Mniotype satura: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 315.

Blepharita satura: Meyer, 1985, Letz. ent. Z. Jg. 6 (4): 9, fig. 32.

翅展 40mm。头、胸黑褐杂黑色；前翅浅褐色杂黑色，中、端区黑褐色，亚中褶基部一黑纹，其后另一黑纹，基线、内线、外线均双线黑色，内线波浪形，外线锯齿形，剑纹后有一黑线连接内线和外线，环纹、肾纹浅褐色，亚端线灰白色锯齿形，内侧一列黑齿纹；后翅与腹部暗褐色。

寄主 葎草、忍冬属。

分布 黑龙江、新疆；朝鲜，欧洲。

黑褐毛眼夜蛾 *Blepharita lama* (Staudinger) (图版 XXV-2)

Hadena? lama Staudinger, (1900) 1899, Iris 12: 370, pl. 5, fig. 16. (新疆库尔勒)

Eumichtis lama: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 516, pl. 108, fig. 6.

Crino lama: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 132, pl. 32d. —Draudt, 1934, ibid. Suppl. p. 140, —Heydemann, 1938, Ent. Rdsch. 55: fig. 226 male genitalia.

翅展 35mm。头部与胸部黑棕色杂有少许灰色，下胸浅褐色，足红褐色；前翅黑褐色，各横线不明显，基线与内线均双线黑色，波浪形外斜，剑纹黑色，稍长，环纹白色，近圆形，中央有黑褐纹，肾纹明显，白色，中央为黑曲纹，内、外侧衬黑色，外线双线黑色，锯齿形外弯，4脉后内斜，线间色浅，翅外缘有一列新月形黑纹；后翅黄白色，大部带褐色，隐约可见黑褐色外线，端区带黑褐色；腹部暗褐灰色。

分布 新疆。