

双线黑色锯齿形，亚端线浅黄色波曲形，3、4脉处锯齿形，线内侧衬暗褐色；后翅浅褐色；腹部褐色。

分布 青海。

褐灰毛眼夜蛾 *Blepharita petrolignea* (Draudt) (图版 XXV-5)

*Parastichtis petrolignea*, Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 88, pl. 6, fig. 9. (四川巴塘)

*Blepharita petrolignea*; Boursin, 1964, Veroff. zool. StSamml. Munch. 8: pl. 18, fig. 76.

翅展 51mm。头、胸及前翅浅褐灰色，额有黑横条，前翅亚中褶基部一黑纵线伸达外线，有间断，基线双线黑色波浪形，内线及外线黑色锯齿形，剑纹长楔形，灰白色，环纹及肾纹大，灰白色，外线的内一线前段渗散，亚端线不明显，有一列黑纵纹；后翅白色，外线、亚端线褐色，翅外缘后半稍凹；腹部褐色。

分布 四川。

长线毛眼夜蛾 *Blepharita longilinea* (Draudt) (图版 XXV-6)

*Parastichtis longilinea* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 87, pl. 6, fig. 10. (太白山)

翅展 53mm。头部与胸部浅褐灰色，颈板中部有一黑横线；前翅浅褐灰色，亚中褶有一黑纵线，自基部伸达外线，内线黑色，内侧衬浅灰色，微曲外斜，环纹大，斜椭圆形，黑边，前端开放，肾纹大，有不完整的黑边，中有一黑曲纹，外线黑色，外侧衬浅灰色，自前缘脉微曲外斜至5脉折角内斜，4—5脉间有一黑色纵纹，自肾纹伸达亚端线，亚端线隐约可见，浅灰色；后翅浅灰色，基部灰白色，横脉纹黑色；腹部浅褐灰色。

分布 陕西（太白山）、山西（绵山）。

黄绿毛眼夜蛾 *Blepharita praetermissa* (Draudt) (图版 XXV-7)

*Eumichtis praetermissa* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 68, pl. 5, fig. 3. (浙江天目山)

翅展 37mm。头部褐灰色杂少许黑褐色，下唇须的外侧黑色杂灰色；颈板基半部浅黄绿色杂黑色，端部灰色杂黑色。近中部有一黑弧线；胸部背面灰色杂黄绿色及少许黑色，下胸暗褐色；前翅黄绿色，布有黑色细点，基线双线黑色，波浪形，自前缘脉至1脉，1脉基部前缘黑色，内线双线黑色，不规则波浪形外斜，内一线弱，剑纹稍大，黑边，其外侧有一双齿形黄白斑伸达外线，环纹大，轮廓不清，黄白色，可见中央黑褐圈，肾纹模糊，浅黄绿色，中有褐纹，外线黑色，深锯齿形外弯，4脉后内弯，亚端线