

双线黑色锯齿形，亚端线浅黄色波曲形，3、4脉处锯齿形，线内侧衬暗褐色；后翅浅褐色；腹部褐色。

分布 青海。

褐灰毛眼夜蛾 *Blepharita petrolignea* (Draudt) (图版 XXV-5)

Parastichtis petrolignea, Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 88, pl. 6, fig. 9. (四川巴塘)

Blepharita petrolignea; Boursin, 1964, Veroff. zool. StSamml. Munch. 8: pl. 18, fig. 76.

翅展 51mm。头、胸及前翅浅褐灰色，额有黑横条，前翅亚中褶基部一黑纵线伸达外线，有间断，基线双线黑色波浪形，内线及外线黑色锯齿形，剑纹长楔形，灰白色，环纹及肾纹大，灰白色，外线的内一线前段渗散，亚端线不明显，有一列黑纵纹；后翅白色，外线、亚端线褐色，翅外缘后半稍凹；腹部褐色。

分布 四川。

长线毛眼夜蛾 *Blepharita longilinea* (Draudt) (图版 XXV-6)

Parastichtis longilinea Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 87, pl. 6, fig. 10. (太白山)

翅展 53mm。头部与胸部浅褐灰色，颈板中部有一黑横线；前翅浅褐灰色，亚中褶有一黑纵线，自基部伸达外线，内线黑色，内侧衬浅灰色，微曲外斜，环纹大，斜椭圆形，黑边，前端开放，肾纹大，有不完整的黑边，中有一黑曲纹，外线黑色，外侧衬浅灰色，自前缘脉微曲外斜至5脉折角内斜，4—5脉间有一黑色纵纹，自肾纹伸达亚端线，亚端线隐约可见，浅灰色；后翅浅灰色，基部灰白色，横脉纹黑色；腹部浅褐灰色。

分布 陕西（太白山）、山西（绵山）。

黄绿毛眼夜蛾 *Blepharita praetermissa* (Draudt) (图版 XXV-7)

Eumichtis praetermissa Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 68, pl. 5, fig. 3. (浙江天目山)

翅展 37mm。头部褐灰色杂少许黑褐色，下唇须的外侧黑色杂灰色；颈板基半部浅黄绿色杂黑色，端部灰色杂黑色。近中部有一黑弧线；胸部背面灰色杂黄绿色及少许黑色，下胸暗褐色；前翅黄绿色，布有黑色细点，基线双线黑色，波浪形，自前缘脉至1脉，1脉基部前缘黑色，内线双线黑色，不规则波浪形外斜，内一线弱，剑纹稍大，黑边，其外侧有一双齿形黄白斑伸达外线，环纹大，轮廓不清，黄白色，可见中央黑褐圈，肾纹模糊，浅黄绿色，中有褐纹，外线黑色，深锯齿形外弯，4脉后内弯，亚端线

不明显，黄白色，在 7 脉前外突，中段外弯，翅外缘有一列新月形黑纹；后翅白色，约可见褐黑色外线与亚端线，翅脉纹微黑，端线黑色；腹部灰色，端部背面色暗。

分布 陕西、浙江。

德毛眼夜蛾 *Blepharita draudti* Boursin (图版 XXV-8)

Blepharita draudti Boursin, 1952, Z. wien. ent. Ges. 37: 136. (云南德钦)

Maganephria adusta, Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 66, pl. 4, fig. 25.

翅展 42mm。头、胸、腹褐色；前翅灰色微褐，中区带黑褐色，基线、内线及外线均双线黑色，基线波浪形，外线锯齿形，亚中褶基部一黑纹，剑纹端部外伸一黑纹达外线，环纹、肾纹灰白色，中线黑色锯齿形，外线前后段的双线间白色，线外侧的 1 脉前有一黑纹，亚端线褐黄色波浪形，内侧一列黑褐纹；后翅白色带灰褐色，外线、亚端线黑褐色。

分布 云南。

白斑毛眼夜蛾 *Blepharita niveiplaga* (Walker) (图版 XXV-9)

Hadena niveiplaga Walker, 1857, List. Spec. Ins. Colln Br. Mus. 11: 593. (印度)

Trachea niveiplaga: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 204. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.978.

Blepharita niveiplaga: Boursin, 1964, Veroff. zool. StSamml. Munch. 8: 33.

翅展 43mm。头、胸、腹及前翅褐色，后翅黑褐色。前翅基线、内线及外线均双线黑褐色，基、内线波浪形，外线锯齿形，剑纹、环纹及肾纹褐色黑边，肾纹外有一白点，其后有二小白点，中线黑色波浪形，外线的齿尖为黑、白点，亚端线灰色锯齿形，内侧一列黑齿纹。

分布 湖南；印度，巴基斯坦。

齐毛眼夜蛾 *Blepharita concinna* (Leech) (图版 XXV-10)

Apamea concinna Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 61. (中国西部：Wa-ssu-kow)

Eumichtis cocinna: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 516, pl. 108, fig. 7.

Dryobotodes concinna: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 134, pl. 32h.

翅展 40mm。头、胸及前翅黄绿色，颈板有一黑线，前翅亚中褶基部一黑纹，基线、内线均双线黑色波浪形，剑纹端部尖，环纹斜圆，肾纹大，中线及外线黑色锯齿形；后者双线，内线、外线间大部带黑褐色，此间亚中褶另一黑纵条，亚端线黄绿色，内侧衬黑色，中段锯齿形；后翅浅灰微带黑褐色，外线、亚端线细，黑褐色；腹部暗灰色。

分布 云南。