

者双线锯齿形，亚端线白色间断，中段内侧有几个黑齿纹；后翅浅褐色，端区色暗。雄蛾抱器腹延伸成一叉形突（图 440）。

分布：青海、云南。

润睫冬夜蛾 *Blepharosis dianthoecina* (Staudinger) (图版 XXV-14)

Hadena dianthoecina Staudinger, 1895, Iris 8: 323. (青海湖与罗布泊之间)

Apamea montana Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 61.

Blepharidia dianthoecina: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 398. ——Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 141.

翅展 31mm。头、胸及前翅霉绿褐色，前翅亚中褶基部有黄白点，其后有二黑纹，内线黑棕色衬白色，剑纹黑边，环纹及肾纹白色黑边，中线不明显，外线双线黑色锯齿形，线间白色，外侧 1 脉前有一白斑，亚端线白色，内侧衬黑褐色，在 3、4 脉处强锯齿形，线中段内侧有黑齿纹；后翅褐色，中线微白；腹部灰褐色。

分布：青海、四川。

荟睫冬夜蛾 *Blepharosis poecila* (Draudt) (图版 XXV-15)

Blepharidia poecila Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 75, pl. 5, fig. 13. (云南丽江)

Blepharosis poecila: Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1017.

翅展 32mm。头、胸及前翅棕色，前翅内线内方大部灰白色，亚中褶基部一黑纹，后方带乳黄色，内线、中线黑色，内线前端为双黑点，剑纹不明显，环、肾纹白色，前者内端尖，外线双线黑褐色锯齿形，线间白色，亚端线白色，在 6—7 脉处成一斑块状，在 3、4 脉处锯齿形外突，线内侧 2—5 脉间有一列黑点，线外侧在中褶及 1 脉前各一黑点，外线与亚端线在 2—6 脉间相触；后翅浅褐黄色，端区一黑褐宽带；腹部褐色。

分布：云南。

褐睫冬夜蛾 *Blepharosis retracta* (Draudt) (图版 XXV-16)

Blepharidia retracta Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 77, pl. 5, fig. 16. (云南丽江)

翅展 34mm。头部与胸部褐色，头顶饰长毛，翅基片内缘褐灰色，足跗节黑褐色，各节间有白斑；前翅褐色，基线粗，黑色，波浪形，自前缘脉至 1 脉，后端内突，内线双线黑色，微波曲外斜，内一线弱，线间白色，亚中褶基部有一黑纵纹，剑纹窄小，黑边，环纹斜，前窄后宽，白色，黑边，中线黑色，不明显，自前缘脉波曲外斜至肾纹后端，折角锯齿形内斜，外线双线黑色，锯齿形外弯，4 脉后内斜，线间白色，外一线细弱，外区前缘脉黑色，有 3 个白点，亚端线白色，在 3、4 脉处成外突齿，齿尖近达翅