

外缘，线内侧有一列三角形黑斑，位于6—8脉间及3—5脉间，前后段内侧有不规则形黑斑，线外侧在8脉后亦有黑斑，翅外缘有一列新月形黑纹；后翅褐色，端区微带黑色；腹部浅灰褐色。

分布 青海、云南。

灰睫冬夜蛾 *Blepharosis bryocharis* Boursin (图版 XXV-17)

Blepharosis bryocharis Boursin, 1964, Veroff. zool. Staat. Munch. 8: 34, pl. 3, fig. 56; pl. 20, fig. 84. (尼泊尔)




图 441 灰睫冬夜蛾 *Blepharosis bryocharis* Boursin

♂ 外生殖器

翅展 35mm。头、胸及前翅灰色杂黑色，前翅并杂白色，密布细黑点，基线、内线均双线黑色波浪形，双线间均白色，剑纹黑灰色，环纹、肾纹白色，外线双线黑色锯齿形，线间白色。亚端线白色，锯齿形，内侧一列黑纹；后翅灰色带褐，可见亚端线；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣宽，抱器腹稍延伸（图 441）。

分布 西藏；尼泊尔。

辉睫冬夜蛾 *Blepharosis griseirufa* (Hampson) (图版 XXV-18)

Polia griseirufa Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 233. (锡金)

Blepharidia griseirufa: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 400. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 112.

Blepharosis griseirufa: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 317. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p. 218. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 970.

翅展 26mm。头部与胸部褐色，足跗节各节间有灰白环；前翅红棕色，端区蓝灰

色，有金属光泽，布有黑棕色细点，翅脉黑色杂灰色，基线灰白色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，内线双线灰色，外弯，环纹只现一蓝灰色点，肾纹大部白色，内侧有一小白点，隐约可见灰白色中线，波浪形，外线双线蓝灰色，自前缘脉后外弯至4脉，其后内斜，外区前缘脉上有一列灰白点，亚端线灰白色，内侧红棕色，大波浪形，在中褶及3脉后内弯，翅外缘有一列棕黑点，缘毛红棕色；后翅暗褐灰色，有光泽，缘毛红棕色；腹部暗灰褐色。

分布 西藏；不丹，锡金。

秀睫冬夜蛾 *Blepharosis retrahens* (Draudt) (图版 XXV-19)

Blepharidia retrahens Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 76, pl. 5, fig. 18. (云南丽江, 山东泰山)

Blepharosis retrahens: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 113.

翅展 29mm。头、胸及前翅黑褐色，前翅有少许蓝白鳞，基线、内线、外线均双线黑色，后者锯齿形，双线间黄白色，内侧有新月形黑纹，剑纹圆钝，环纹斜圆形，灰黄色，肾纹黄白色，亚端线浅黄色，间断为新月形纹，内侧衬黑色；后翅浅褐色；腹部褐灰色。

分布 山东、云南、西藏。

鹰冬夜蛾属 *Valeria* Stephens

Valeria Stephens 1829, Nom. Br. Ins. 42: 42

Type-species: *Bombyx oleagina* [Denis et Schiffermüller].

Synvaleria Butler, 1890, Trans. ent. Soc. Lond. p. 672.

喙发达，下唇须向上伸，第一、二节前缘有毛，第三节稍向前伸，额平滑，复眼圆大；胸部主要是毛；腹部基部几节有毛簇，侧面有毛；前翅外缘微锯齿形，有副室。

种 检 索 表

- 1. 肾纹巨大 巨肾鹰冬夜蛾 *Valeria exanthema*
肾纹中常 2
- 2. 前翅外区亚中褶处有黑纹 绵鹰冬夜蛾 *V. mienshani*
前翅外区亚中褶处无黑纹 3
- 3. 前翅有绿色亚端带 绿鹰冬夜蛾 *V. viridimacula*
前翅无绿色亚端带 4
- 4. 翅展 46mm 左右 碧鹰冬夜蛾 *V. tricristata*
翅展 36mm 左右 刚鹰冬夜蛾 *V. muscosula*