

前翅外线锯齿形 灰睫冬夜蛾 *B. bryocharis*

黍睫冬夜蛾 *Blepharosis paspa* (Püngeler) (图版 XXV-12)

Blepharidia paspa Püngeler, 1900, Iris, 13: 123 (青海湖区; Amdo 地区, 近 Sinin)
Trigonophora grumi Alpheraky, 1892, Hor. ent. Soc. ross. 16: 449.
Blepharidia paspa: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 397.
Blepharosis paspa: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 317.

翅展 35mm。头、胸及前翅红棕色, 前翅中区及端区深棕色, 基线、内线均双线黑色波浪形, 基线后方一灰斑, 剑纹棕色, 环纹小, 灰白色, 肾纹窄长, 白色黑边, 中线黑色, 后半波浪形, 外线双线黑色锯齿形, 线间灰白色, 亚端线白色, 在 3、4 脉处锯齿形外突, 内侧前端及 2—5 脉间有黑斑; 后翅红棕带黑褐色, 中线与亚端线可见, 后者似带状; 腹部棕褐色。

分布 甘肃、青海、云南、西藏; 印度。

睫冬夜蛾 *Blepharosis lama* (Püngeler) (图版 XXV-13)

Heliophobus lama Püngeler, (1900) 1899, Iris 12: 293, pl. 9, fig. 8. (青海湖区)
Blepharidia lamida Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 74.
Blepharidia lama: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 398.
Blepharosis lama: Boursin, 1964, Ver. zool. Staat. Munch. 8. 33. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 113.




图 440 睫冬夜蛾 *Blepharosis lama* (Püngeler) ♂ 外生殖器

翅展 35mm。头、胸、腹及前翅暗褐杂灰色, 前翅基区后部杂少许绿色, 基线黑色, 内线双线波浪形, 剑纹褐色黑边, 环纹灰白色黑边, 肾纹白色黑边, 中、外线黑色, 后