

条，中线褐色，波浪形，外线褐色，不规则波浪形外弯，在亚中褶处内凸，亚端线隐约可见，不规则波曲；后翅淡灰褐色，可见深褐色短小的横脉纹；外线深褐色；腹部褐色。

寄主 化香的枯叶。

分布 山东、湖南、台湾、福建、广东、广西、西藏；日本，印度，斯里兰卡，东南亚。

尖须夜蛾属 *Bleptina* Guenée

Bleptina Guenée, 1854, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 8: 66.

Type-species: *Bleptina caradrinalis* Guenée.

Opotura Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 191.

Anagoa Moschler, 1886, Abh. senck. natur. Ges. 14 (3): 62.

喙发达，下唇须镰刀形，第二节超过头顶，第三节尖而长，后缘有毛簇，雄蛾触角有短纤毛丛；胸、腹部鳞片平滑；前翅顶角稍尖，有副室；前足胫节下缘常有一鞘，内有成块的鳞丛。

种 检 索 表

- 1. 前翅中、外、亚端线近直线 白线尖须夜蛾 *Bleptina albolinealis*
前翅各横线非全直线 2
- 2. 前翅内线、外线白色，近呈直线 3
前翅内线、外线黑色 伸尖须夜蛾 *B. propugnata*
- 3. 前翅 2、3 脉基半部白色 四叉尖须夜蛾 *B. ambigua*
前翅 2、3 脉基半部非白色 4
- 4. 前翅中脉白色 白纹尖须夜蛾 *B. albovenata*
前翅中脉非白色 5
- 5. 前翅内线在中室前折角 脉尖须夜蛾 *B. venata*
前翅内线直 并线尖须夜蛾 *B. pararella*

白线尖须夜蛾 *Bleptina albolinealis* Leech (图版 LXVII-38)

Bleptina albolinealis Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 627. (九江)

Bleptina albolinealis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425, pl. 75a. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.370. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1037,

翅展 30 mm。头部褐色，下唇须向上伸并向后弯至胸部背面，第三节细，端部尖；胸部褐色；前翅赭褐色，端区淡褐黄色，前缘区色较暗，内线黑色，外侧衬明显白色，在前缘区不明显，肾纹为一黑色长点，外线白色，外侧衬黑色，直线内斜，亚端线白色，内侧衬黑色，直线内斜，翅外缘有一列黑点；后翅黄白色，中室及其后方带有褐色，外线白色，前段不显，亚端线白色，自前缘外斜至 6 脉弯曲内斜，在 1 脉处折角内斜，外线与亚端线之间带有褐色，翅外缘有一列黑点；腹部褐灰色。

分布 湖南、江西、福建、广西、四川。

伸尖须夜蛾 *Bleptina propugnata* Leech (图版 LXVII-39)

Bleptina propugnata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 623. (中国西部: Wa-shan)

Bleptina propugnata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 424, pl. 75a. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.370, pl. 26, fig. 1.

翅展 33 mm。头部黑褐色带灰色，下唇须向上弯，外侧褐黄色杂有少许黑褐色，第三节细，端部尖，黄白色；胸部背面黑褐色带灰色，颈板黑色杂灰色，基部红棕色，足外侧黑褐色，胫节端部及胫距有浅黄斑，跗节各节间有浅黄斑；前翅浅褐灰色，大部带有黑褐色，内线双线黑色，线间色浅，稍波曲，外线双线黑色，自前缘脉后外弯，在中褶稍内凹，在 2—5 脉间明显外凸，亚端线淡褐色，不清晰，中段外弯；后翅褐灰色，隐约可见灰白色亚端线，其后半内侧衬暗褐色；腹部灰色。

分布 海南、四川、西藏。

四叉尖须夜蛾 *Bleptina ambigua* Leech (图版 LXVII-40)

Bleptina ambigua Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 620. (中国西部)

Bleptina ambigua: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 424, pl. 741. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1037.

翅展 37 mm。头部暗褐色，下唇须向上弯，外侧黑褐色，第二节端部赭黄色，第三节后缘有长鳞簇，节端赭黄色；胸部背面暗褐色，前足胫节外侧黑褐色，中足与后足胫节赭黄色杂黑褐色，跗节外侧黑色，各节间有浅黄斑；前翅暗褐色，内线粗，白色，微曲内斜，中脉白色，2、3、4、5 脉内半部白色，肾纹窄，白色新月形，亚端线白色，在 7 脉处外弯，2—5 脉间强外弯，端线由一系列新月形黑纹组成；后翅暗褐色，外线白色，在 5 脉之前不明显，微曲，亚端线白色，细弱，在 5 脉之前隐约可见，5 脉后细波浪形，端线由一系列新月形黑纹组成；腹部暗褐色，基部背面带黄色。

分布 湖南、福建、海南、四川。