

白纹尖须夜蛾 *Bleptina albovenata* Leech (图版 LXVII-41)

Bleptina albovenata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 619. (中国西部: Chia-kou-ho, Moupin, Ni-tou, Wa-shan)

Bleptina albovenata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423, pl. 72g. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noc. 2: 145. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.370.

翅展 28 mm。头部棕黑色，下唇须向上伸，弯过头顶，内侧灰白色，外侧黑色杂少许灰色；胸部棕黑色，前足与中足胫节外侧棕色，第二节端部赭白色，第三节黄灰色带褐色，跗节外侧黑褐色，各节间有灰白斑，颈板棕色杂黑色，翅基片基部红棕色；前翅棕黑色，基线白色，自前缘脉达亚中褶，内线白色，在前缘脉后折角，直线内斜，肾纹白色窄曲，中脉及亚端线内方的 3、4、7 脉均白色，外线白色，较粗，直线内斜，亚端线前端白色，7 脉后不明显，端线由一系列黑点组成；后翅灰棕色，外线白色，仅在 3 脉后可见，隐约可见微白的亚端线，端线黑色；腹部棕黑色。

分布 四川、西藏。

脉尖须夜蛾 *Bleptina venata* Leech (图版 LXVII-42)

Bleptina venata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 624. (峨眉山)

Bleptina venata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 424, pl. 75a.

翅展 36 mm。头部深棕色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须向上伸，远超过头顶；胸部背面黄褐色，颈板深棕色，足胫节外侧黑棕色，胫距及跗节各节间有褐黄斑，前足跗节灰黄色；前翅黄褐色，翅基部及前缘区大部深褐色，翅脉赭黄色，基线赭黄色，不明显，自前缘脉外弯至亚中褶，内线赭黄色，自前缘脉外斜至中室前缘，强折角直线内斜，环纹不显，肾纹极窄小，只现一黄白色短曲纹，中线隐约可见暗褐色，自肾纹后波曲内斜至翅后缘，外线赭黄色，较粗，自前缘脉直线内斜亚端线细弱，褐黄色，在 7 脉与 4 脉处外凸，端线由一系列三角形黑点组成；后翅黄褐色微带灰色，隐约可见暗褐色横脉纹，外线赭黄色，较粗，直线内斜，亚端线不明显，淡黄色，不规则锯齿形，端线由一系列扁三角形黑点组成，缘毛赭黄色，中有一暗褐线；腹部黄褐色。

分布 福建、四川。

并线尖须夜蛾 *Bleptina parallela* Leech (图版 LXVIII-1)

Bleptina parallela Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 626. (峨眉山, Moupin, Wa-shan, Chia-kou-ho, Foochau)

Bleptina parallela: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425, pl. 75a. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan