

白纹尖须夜蛾 *Bleptina albovenata* Leech (图版 LXVII-41)

Bleptina albovenata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 619. (中国西部: Chia-kou-ho, Moupin, Ni-tou, Wa-shan)

Bleptina albovenata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423, pl. 72g. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noc. 2: 145. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.370.

翅展 28 mm。头部棕黑色，下唇须向上伸，弯过头顶，内侧灰白色，外侧黑色杂少许灰色；胸部棕黑色，前足与中足胫节外侧棕色，第二节端部赭白色，第三节黄灰色带褐色，跗节外侧黑褐色，各节间有灰白斑，颈板棕色杂黑色，翅基片基部红棕色；前翅棕黑色，基线白色，自前缘脉达亚中褶，内线白色，在前缘脉后折角，直线内斜，肾纹白色窄曲，中脉及亚端线内方的 3、4、7 脉均白色，外线白色，较粗，直线内斜，亚端线前端白色，7 脉后不明显，端线由一系列黑点组成；后翅灰棕色，外线白色，仅在 3 脉后可见，隐约可见微白的亚端线，端线黑色；腹部棕黑色。

分布 四川、西藏。

脉尖须夜蛾 *Bleptina venata* Leech (图版 LXVII-42)

Bleptina venata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 624. (峨眉山)

Bleptina venata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 424, pl. 75a.

翅展 36 mm。头部深棕色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须向上伸，远超过头顶；胸部背面黄褐色，颈板深棕色，足胫节外侧黑棕色，胫距及跗节各节间有褐黄斑，前足跗节灰黄色；前翅黄褐色，翅基部及前缘区大部深褐色，翅脉赭黄色，基线赭黄色，不明显，自前缘脉外弯至亚中褶，内线赭黄色，自前缘脉外斜至中室前缘，强折角直线内斜，环纹不显，肾纹极窄小，只现一黄白色短曲纹，中线隐约可见暗褐色，自肾纹后波曲内斜至翅后缘，外线赭黄色，较粗，自前缘脉直线内斜亚端线细弱，褐黄色，在 7 脉与 4 脉处外凸，端线由一系列三角形黑点组成；后翅黄褐色微带灰色，隐约可见暗褐色横脉纹，外线赭黄色，较粗，直线内斜，亚端线不明显，淡黄色，不规则锯齿形，端线由一系列扁三角形黑点组成，缘毛赭黄色，中有一暗褐线；腹部黄褐色。

分布 福建、四川。

并线尖须夜蛾 *Bleptina parallela* Leech (图版 LXVIII-1)

Bleptina parallela Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 626. (峨眉山, Moupin, Wa-shan, Chia-kou-ho, Foochau)

Bleptina parallela: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425, pl. 75a. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan

p.1037.

翅展 37 mm。头部黑棕色杂少许浅褐色，下唇须向上弯，浅赭黄色杂少许黑褐色；胸部黑棕色杂淡褐色，足胫节外侧褐黑色，端部浅赭黄色，跗节黑色，各节间有赭黄斑；前翅灰色，密布黑棕细点，内线黄白色，外侧衬黑褐色，微波曲内斜，肾纹黑色杂有黄白色，中部凹，使似呈二黑点，外线黄白色，外侧衬黑色，近呈直线内斜，与内行近平行，亚端线不清晰，黄白色，锯齿形，在中褶处内凹，2—4 脉间外凸，中段两侧有模糊黑点，端线由一系列三角形黑点组成，外线外方区域色暗褐；后翅灰色，布有黑棕细点，外线黄白色，外侧衬黑褐色，在 1 脉后稍折向内斜，前段较弱，外线外方区域杂有暗褐色模糊点纹，端线由一系列黑色三角形点组成；腹部背面黑棕色，基部灰色。

分布 浙江、湖南、江西、福建、海南、四川。

拟胸须夜蛾属 *Bertula* Walker

Bertula Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 162.

Type-species: *Bertula abjudicalis* Walker.

Neviasca Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 7.

Cardalena Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 19: 888.

Gabrisa Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1174.

喙发达，下唇须向上伸，雄蛾下唇须镰刀形，弯到胸背中部，第二节前缘有毛，第二、三节后缘有长毛簇；前足胫节无鞘；前翅前缘脉间向下有一褶，起翅缰钩作用。

种 检 索 表

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. 前翅窄 | 2 |
| 前翅中常 | 3 |
| 2. 前翅亚端线自顶角内斜 | 条拟胸须夜蛾 <i>Bertula spacoalis</i> |
| 前翅亚端线不达顶角 | 波拟胸须夜蛾 <i>B. sinuosa</i> |
| 3. 前翅内、外线白色 | 双拟胸须夜蛾 <i>B. bistrigata</i> |
| 前翅内、外线非白色 | 4 |
| 4. 前翅内线外侧有一白带 | 5 |
| 前翅内线外侧无白带 | 异拟胸须夜蛾 <i>B. hisbonalis</i> |
| 5. 白带宽 | 锯拟胸须夜蛾 <i>B. dentilinea</i> |
| 白带窄 | 黑带拟胸须夜蛾 <i>B. abjudicalis</i> |

条拟胸须夜蛾 *Bertula spacoalis* (Walker) (图版 LXVIII-2)

Bleptina spacoalis Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 19: 872. (华北)