

波夜蛾属 *Bocana* Walker

Bocana Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 170.

Type-species: *Bocana manifestalis* Walker.

Lamura Walker, [1859], List Spec. Lep. Br. Mus. 16: 189.

Asthala Moore, 1882, Lep. Atk. p. 196.

喙发达，雄蛾下唇须第二节平滑，第三节裸而上弯，雄蛾触角双栉状；前顶角突出，外缘斜弯，雄蛾反面有一大前缘褶。

淡缘波夜蛾 *Bocana marginata* (Leech) (图版 LXVII-12)

Adrapsa marginata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond, p. 614. (九江)

Bocana marginata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423, pl. 74h. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 382. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1037. —Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p.550.

翅展 35 mm。头部褐色，雄蛾触角双栉形，外侧栉齿长，内侧齿短；胸部褐色；前翅淡褐色，散布暗褐细点，前缘区带有暗灰色，内线黑色，微曲内斜，在中室之前不明显，线外侧衬白色，肾纹黑色，窄而斜，外线黑色，自前缘脉微曲内斜，4脉后内弯，2脉后折向外斜，线外侧衬白色，亚端线黑色，较直内斜，黑色向内稍扩展，线外侧衬白色，翅外缘有一列黑点；后翅浅褐色带灰色，前缘区与外缘区微黄，外线黑色细弱，前缘区内不明显，线内方色较暗，亚端线黑色，较模糊并向内扩展，在前缘脉后内凹，其后较直，外侧衬白色，端线黑色；腹部淡黄褐色，背面后半部褐灰色。

分布 浙江、湖南、江西、福建、贵州。

白肾夜蛾属 *Edessena* Walker

Edessena Walker, [1859], 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 162.

Type-species: *Edessena gentiusalis* Walker.

喙发达；额平滑，微圆；下唇须扁平，向上曲伸，成镰刀形，第二节宽，鳞片紧密，第三节尖，仅为第二节长度的一半左右，雄蛾触角亚锯齿形，每齿有一对弯曲的鬃毛；胸、腹鳞片平滑；腿节与胫节有许多毛簇，跗节基部也有小毛簇；前翅雌较雄宽，顶角略伸，外缘微曲；后翅很大，6、7脉合一柄，5脉从中室下角附近伸出；前、后翅中室外侧均有一半透明白纹。

种 检 索 表

肾纹为大白斑……………白肾夜蛾 *Edessena gentiusalis*