

黄畸夜蛾 *Bocula pallens* (Moore) (图版 LX-29)

Poaphila pallens Moore, 1882, Lep. Atk. part 2: 172, pl. 5, fig. 9. (印度加尔各答)

Borsippa pallens: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 517. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 368.

Bocula pallens: Poole, 1989, Lep. Cat., Noct. p. 172.

翅展 30 mm。头部黄褐色，下唇须外侧褐黑色，复眼后方有褐黑色鳞毛；胸部背面黄褐色，足外侧褐黑色；前翅黄褐色，内线微黑，自前缘脉外斜至中室，其后为黑点列，中线褐色，大波浪形，肾纹只现一黑点，外线褐色，自前缘脉后外弯，至 4 脉后内弯，亚端线黑色，间断为点列，端区有一大棕色斑，其内缘内凸于 4—6 脉间，前、后端渐窄，端线由一系列黄褐点组成；后翅黄白色，外缘微带褐色，雄蛾后翅短小，前缘后有一片致密鳞片簇，顶角有厚密毛丛；腹部灰褐色。

分布 福建、云南、西南；印度等。

完斑畸夜蛾 *Bocula divergens* Prout (图版 LX-30)

Bocula divergens Prout, 1926, Sarawak Mus. Jour. 3: 235, pl. 8, fig. 2. (Sarawak)

Bocula divergens: Holloway, 1976, Moths Borneo p.35.

翅展 29 mm。头部与胸部浅黄褐色，下唇须外侧褐色，前足胫节外侧暗褐色，各足跗节褐色，各节间有褐黄斑；前翅浅黄褐色，前缘区内半部色稍暗，内线微弱，褐色，波曲内斜，中线褐色，自前缘脉至中室，斜角内斜至中室后缘再折角外斜，肾纹只现一黑褐点，外线隐约可见极微弱并间断的褐短纹，端区一大黑褐斑，其内缘内弯，后端达臀角，翅外缘有一列褐黄点于前缘脉至 5 脉间；后翅浅褐黄色，端区褐色；腹部浅褐色。

分布 海南；马来西亚。

角斑畸夜蛾 *Bocula microscala* Holloway (图版 LXI-1)

Bocula microscala Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 35, text fig. 221, pl. 14: 172. (Borneo)

翅展 30 mm。头部与胸部灰褐色；前翅灰褐色，前缘区黑褐色至外线，全翅布有黑褐细点，内线黑褐色，自前缘脉直线内斜至翅后缘，中线稍粗，黑褐色，稍内弯，肾纹只现一微弱黑褐细纹，外线黑褐色，与中线近平行，端区有一褐黑色大斑，其内缘起自顶角后，内凸成一小齿，6 脉后强内凸达翅外区折角后行，3 脉后折向外斜达臀角，缘毛棕黑色；后翅灰褐色。

分布 海南；加里曼丹岛，印度尼西亚。