

齿斑畸夜蛾 *Bocula quadrilineata* (Walker) (图版 LXI-2)

Borsippa quadrilineata Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1756. (沙撈越)

Borsippa quadrilineata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 516. —Chen, 1982, Icon. Het.

Sin. 3: 368. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1025.

Bocula quadrilineata: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 35.

翅展 28 mm。头部灰褐色，触角基节灰黄色；胸部背面灰褐色，前足胫节及跗节外侧褐黑色；前翅灰褐色，基线黑褐色，微外斜，自前缘脉至亚中褶，内线黑褐色，在前缘脉后微外凸，其后较直向后，1脉后微外斜，中线双线黑褐色，微内弯，外线黑褐色，微内弯，端区有一大黑斑，内缘在顶角处窄缩成一短钩形，在7脉后强内伸，近达外线，成一钝圆角折向外斜达臀角；后翅灰褐色；腹部灰褐色。

分布 浙江、福建、广西、四川；锡金，南太平洋岛屿。

窗夜蛾属 *Thyrostipa* Hampson

Thyrostipa Hampson, 1926, Descr. new Gen. Spec. Lep. Noct. Br. Mus. p. 574.

Type-species: *Thyridospila sphaeriophora* Moore.

喙发达，下唇须向上伸，第二节超过头顶，第三节长，额光滑无突起，上部有毛簇，腹眼大，圆形，雄蛾触角线形，有纤毛丛，胸部无毛簇，中足胫节膨大，有一褶，内含长毛簇，前翅顶角尖，外缘在4脉处突成角，有一副室，后翅外缘在4脉后尖突，中室长约为翅长之1/3，5脉发达，自中室下角前发出，腹部无毛簇。

窗夜蛾 *Thyrostipa sphaeriophora* (Moore) (图版 LXI-3)

Thyridospila sphaeriophora Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 79. (Bengal)

Zethes sphaeriophora: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 9. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin.

3: 376. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1031.

Thyrostipa sphaeriophora: Holloway, 1976, Moths Borneo. p. 40, fig. 257.

翅展 40 mm。头部灰褐色，额杂有白色，触角基节前缘有一白斑，触角干基部1/3的内缘间有白色；胸部灰褐色，下胸与足褐白色，前足胫节外侧暗褐色，中足胫节的近端部有黑褐斑，后足腿节外侧有一黑褐曲纹，胫节近基部有一黑褐斑；前翅灰褐色，基线黑褐色，波曲内斜，自前缘脉至1脉，内线黑棕色，微波曲外弯，前端内侧衬淡黄色，环纹足形，半透明，肾纹窄曲，半透明，中线粗，黑棕色，模糊，自前缘脉外斜，在中褶处呈细波浪形外弯于中室外，4脉后大波曲内斜，外线黑棕色，在9脉前细锯齿形外斜，其后深锯齿形外弯，6脉后内斜，前段外侧有一微白斑，外方的前缘脉上有一列白点，亚端线黑棕色双线波浪形，前段内侧一近三角形黑褐斑；后翅灰褐色，中线黑