

背面无毛簇；前翅有副室；后翅 6、7 脉共柄。

刃冬夜蛾 *Copitype pagodae* (Alpheraky) (图版 XXIV-11)

Dasypolia pagodae Alpheraky, 1892, Hor. So. ent. ross. 26: 451. (Amdo 地区)

Copitype pagodae: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 206. ——Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 121. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 104.

体长 15mm 左右，翅展 34mm 左右。头部与胸部灰色杂浅褐及少许黑褐色；前翅浅灰褐色，亚中褶基部一黑纹，内线、外线黑色，后者波浪形，环纹、肾纹灰色，中线褐色，亚端线灰白色锯齿形，两侧有黑齿纹，亚中褶在外线与亚端线间有一黑斑；后翅浅黄褐色；腹部浅灰褐色。

分布 青海。

丝冬夜蛾属 *Bombyciella* Draudt

Bombyciella Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 63.

Type-species: *Bombyciella talpa* Draudt.

喙发达，下唇须短，下缘饰长毛，第三节小，雄蛾触角双栉形；胸部被毛，前、后胸有散开形毛簇；腹部背面有一列毛簇，在第三、四节上较大，雌蛾产卵器较长。

合丝冬夜蛾 *Bombyciella sericea* Draudt (图版 XXIV-12)

Bombyciella sericea Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 63, pl. 4, fig. 20. (莫干山、西天目山)

Bombyciella sericea: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 106. ——Chen, 1993. in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.969.

翅展 25mm。头、胸、腹及前翅白色，前翅部分带浅黑灰色与赭黄色，内线为黑曲带，内侧另一黑线，环纹、肾纹浅赭色，两纹间有一四棱黑斑，肾纹前方浅赭色并外展至外线，外线黑色锯齿形，前端外侧一黑三角斑，前缘二黄白点；后翅黄白色，外线褐色。

分布 浙江、湖南、福建。

柳冬夜蛾属 *Brachylomia* Hampson

Brachylomia Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 220

Type-species: *Cleoceris populi* Strecker.