

前缘脉微曲外斜，在 5 脉外凸，其后内弯，亚端线由一系列小黑斑组成，均衬以白色，顶角有一黑色内斜二齿形纹，翅外缘有一列黑点；后翅灰褐色；腹部灰褐色。

分布 新疆、河南、福建、四川、西藏；印度。

分色卜夜蛾 *Bomolocha bipartita* Staudinger (图版 LXVI-40)

Bomolocha bipartita Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 625, pl. 14, fig. 12. (西伯利亚东南部)

Hypena bipartita: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 436, pl. 75d.

Bomolocha bipartita: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 173. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 16—17.

翅展 26 mm。头部与胸部褐灰色杂黑褐色及少许白色；前翅外线内方黑褐色，外线白色，自前缘脉微曲外斜，至 4 脉折角内弯，在亚中褶外凸，1 脉后微外斜，外线外方灰白色，布有黑褐细点，近外线有一隐约粗线与外线平行，亚端线隐约可见，浅黑褐色，较粗，曲度与外线相似，在 5 脉之前较显，顶角后有一黑褐斜纹，翅外缘各翅脉间有黑点，缘毛褐白色；后翅褐白色，横脉纹黑褐色，翅外缘前半有一列黑褐点；腹部褐灰色。

分布 黑龙江、湖北；日本，俄罗斯。

显卜夜蛾 *Bomolocha perspicua* (Leech) (图版 LXVI-41)

Hypena rhombalis var. *perspicua* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 657. (中国西部：Mou-pin, 峨眉山，湖北宜昌，Ship-y-shan)

Bomolocha perspicua: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 912, pl. 223, figs. 31—34; pl. 357, fig. 32.

翅展 32 mm。头部与胸部褐色；前翅外线内方有一深棕色大斑，外线外方及后方灰白色杂有褐色，外线自前缘脉外斜至 4—5 脉间折角微曲内斜至翅后缘中部，与一自中室后缘基部外斜的白线相遇，环纹与肾纹仅隐约可见较暗的小斑，外线外侧有一与之平行的褐线，亚端线白色，模糊，微波浪形，自前缘脉稍内斜，至 6 脉后外斜，4 脉后折向内斜，前段内侧与外线之间有一近三角形深棕色斑，亚端线与外线之间在 5 脉后有一列深褐色斑，向后渐大，均衬以灰白色，亚端线前段外侧有一灰白色角形内斜纹，其中带有褐色，此斑外侧为深棕色，自顶角起沿此斑及亚端线直至臀角，自 5 脉后色渐浅，翅外缘有一列深棕色长点，缘毛基部灰白色，其余褐色杂白色，中部有一深棕色线；后翅褐色，端线深棕色，缘毛基部灰白色，其余褐色；腹部深褐色，背毛簇端部灰色。

分布 湖北、四川；日本。

双色卜夜蛾 *Bomolocha bicoloralis* Graeser (图版 LXVI-42)

Bomolocha bicoloralis Graeser, [1889] 1888, Berl. ent. Zeit. 32: 381. (西伯利亚：Chabarofka)