

Bomolocha bicoloralis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 912, pl. 223, figs. 28—30.

翅展 28 mm。头部与胸部黑褐色；前翅大部为一褐黑色大斑所据，其后缘自亚中褶基部起至中外区均与翅后缘平行，其外缘自顶角后弯曲内斜，其前缘自前缘脉基部至外区折成一凹，此斑之外的翅色褐白，但亚顶区杂有暗褐色，端线褐黑色，波浪形，缘毛褐白色；后翅黑褐色，隐约可见褐黑色横脉纹，端线褐黑色，缘毛褐白色；腹部灰褐色。

分布 黑龙江、湖北；日本，俄罗斯。

张卜夜蛾 *Bomolocha rhombalis* (Guenée) (图版 LXVI-43)

Hypena rhombalis Guenée, 1854, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Lep. 8: 33. (印度)

Hypena telamonalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 231.

Hypena basistrigalis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 84.

Hypena veronica Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 85.

Hypena rhombalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 83. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 657.

Bomolocha rhombalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433, pl. 73d. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 174. —Chen, 1982, Icon, Het. Sin. 3: 385. p. 552.

翅展 28 mm。头部与胸部深棕色，下胸浅褐色；前翅暗棕色，布有少许蓝白细点，外线外方及后缘区内半灰白色带褐色，外线内方为一近菱形大斑，其后缘起自中室后缘基部，外斜至 1 脉中部，外线白色，自前缘脉微曲外斜，至 3—4 脉处折角内斜，近 1 脉处呈弧形内伸，在 1 脉与大斑后的白色相合，线外侧另有一暗褐线与之平行，其前段外方有一近半圆形暗褐斑，亚端线白色，不规则锯齿形，在各翅脉处间断，线内侧有一列暗褐色齿形纹，在 1 脉后的纹较粗长，一深棕色纹自顶角后内斜至外线折角处，端线由一系列新月形黑点组成，缘毛基部褐黄色，其余灰褐色；后翅褐色，端线由一系列长弧形褐点组成，缘毛浅褐色，基部淡黄色；腹部褐色，背毛簇黑棕色。

分布 河南、江苏、浙江、湖南、福建、广西、四川、西藏；印度，缅甸。

满卜夜蛾 *Bomolocha mandarina* Leech (图版 LXVI-44)

Hypena mandarina Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 658. (中国西部：Pu-tsu-fong, 湖北长阳)

Bomolocha mandarina: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433, pl. 73d. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 173. —Chu et al., 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 148. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 913. —Chen, 1982, Icon.

Het. Sin. 3: 385.

翅展 33 mm。头部棕黑色，头顶有黑褐色杂灰白色的毛簇，下唇须向前平伸，第二节浅褐色杂黑色，上缘饰长密鳞，第三节黑褐色，端部尖，下缘饰密鳞；胸部棕黑色，足浅褐色，但前足胫节外侧黑褐色；前翅内半几全由一大棕色斑所占，其后缘自前缘脉基部后方外斜至翅后缘近中部略前，其外缘与外线平行，自前缘脉外斜至 5 脉折角内斜，斑的后方有一楔形黑纵纹，斑的外侧为细弱黑褐色外线，外线外方棕灰色，亚端线由一系列模糊黑点组成，亚端区前部有一暗褐斑，顶角有一内斜黑纹，端线棕色；后翅烟褐色，横脉纹暗褐色；腹部黑棕色。

分布 浙江、湖北、湖南、福建、四川、云南、西藏；日本。

齐卜夜蛾 *Bomolocha zilla* (Butler) (图版 LXVI-45)

Hypena zilla Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 3: 60, pl. 55, fig. 1. (日本)

Hypena zilla: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 657.

Bomolocha zilla: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 432, pl. 73e. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 21—27.

翅展 28 mm。头部与胸部褐色；前翅外线内方黑褐色，外方褐白色，内线内方浅褐色，内线褐白色，自前缘脉外斜至 1 脉，环纹与肾纹不显，外线褐白色，自前缘脉微曲外斜，至 5 脉折向内斜，在亚中褶处稍外凸，外线外侧有一模糊褐线与之平行，亚端线白色外弯，内侧有模糊暗褐纹，顶角后有一黑褐内斜纹，端线由一系列新月形黑纹组成；后翅褐色，端线黑褐色；腹部灰褐色。

分布 黑龙江、湖北；朝鲜，日本。

多型种，有的个体前翅后缘区色浅，大斑短。

污卜夜蛾 *Bomolocha squalida* (Butler) (图版 LXVI-46)

Hypena squalida Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. p. 60, pl. 56, fig. 2. (日本横滨)

Hypena squalida: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 658.

Bomolocha squalida: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433, pl. 73d. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 185. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 384. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 12—15.

翅展 20 mm。头部暗褐色，额下部黑褐色，下唇须向前平伸，褐色杂浅黄色及黑色，第三节端部浅黄色；胸部背面暗褐色，足浅褐色杂浅黄色；前翅 1 脉基部至后缘近中部前有一白色斜曲线，外线黑色衬白色，自前缘脉微曲外斜，至 6 脉处折向微曲内斜至后缘中部，外线内方翅色黑褐，外方褐色带灰，亚端线由黑色曲纹组成，均衬以白色，前段内侧有一约呈三角形黑褐斑，后端内侧衬一约呈长楔形黑褐纹，顶角有一褐色内斜纹，环纹只现一黑点，肾纹黑色，新月形，均极不明显，端线由一系列黑色组成，均