

fig. 46; pl. 357, fig. 24.

翅展 28 mm。头部与胸部褐色，头顶与下唇须外侧带黑褐色；前翅褐色，布有少许暗褐点，内线黑褐色，自前缘脉外斜至中室前缘，其后弱，波浪形内斜，环纹白色明显，斜足形，边缘暗褐色，外线黑褐色，外侧衬白色，大波浪形，内线与外线之间色暗，亚端线由一系列不整齐黑斑组成，外侧衬黄白色，亚中褶与亚中褶处稍内凹，端线由一系列新月形黑点组成，缘毛端半部暗褐色；后翅褐色。

分布 浙江、湖北、海南；朝鲜，日本，印度，克什米尔地区。

阴卜夜蛾 *Bomolocha stygiana* (Butler) (图版 LXVI-38)

Hypena stygiana Butler, 1878, Ill. Het. Colln. Br. Mus. p. 55, pl. 38, fig. 6. (日本横滨)

Bomolocha stygiana: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 432, pl. 73c, d. — Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 173. — Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 185. — Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 910, pl. 223, figs. 1—4; pl. 357, fig. 26. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 384.

翅展 35 mm。头部棕褐色，下唇须向前平伸，第二节下缘饰密鳞，第三节端部灰色；胸部背面棕褐色，足黄灰色杂黑褐色，前足胫节外侧褐黑色；前翅外线内方为一黑棕色带紫色大斑块，内线浅褐色，自前缘脉外斜至中室前缘折角内斜，至亚中褶再折角外斜，外线白色，自前缘脉微曲外斜至 5 脉折角内弯，至亚中褶后内斜，环纹不显或隐约可见，亚端线灰白色，波浪形，极不明显，内侧有几个模糊黑色斑纹，顶角有一内斜黑纹，端线黑色；后翅灰褐色，横脉纹小，暗褐色；腹部棕褐色。

分布 浙江、江西、西藏；日本，朝鲜。

缩卜夜蛾 *Bomolocha obductalis* Walker (图版 LXVI-39)

Hypena obductalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 56. (印度)

Hypena flexuosa Moore, 1882, Lep. Atk. p. 190.

Hypena obductalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 83. — Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 658.

Bomolocha obductalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433, pl. 73d. — Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 148. — Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 43. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 385. — Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p. 376. — Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1039.

翅展 35 mm。头部灰褐色，少数鳞片端部灰白色，下唇须斜向上伸，第二节黑色杂灰色，端部白色，上缘饰长鳞，第三节细，褐黑色，端部灰白色；胸部灰褐色，足外侧暗褐色，跗节褐黑色，各节间有白斑；前翅外线内方黑棕色，其余褐灰色，内线白色，波浪形，不明显，环纹只现一黑点，肾纹细窄，黑色，外线黑色，外侧衬白色，自

前缘脉微曲外斜，在 5 脉外凸，其后内弯，亚端线由一系列小黑斑组成，均衬以白色，顶角有一黑色内斜二齿形纹，翅外缘有一列黑点；后翅灰褐色；腹部灰褐色。

分布 新疆、河南、福建、四川、西藏；印度。

分色卜夜蛾 *Bomolocha bipartita* Staudinger (图版 LXVI-40)

Bomolocha bipartita Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 625, pl. 14, fig. 12. (西伯利亚东南部)

Hypena bipartita: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 436, pl. 75d.

Bomolocha bipartita: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 173. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 16—17.

翅展 26 mm。头部与胸部褐灰色杂黑褐色及少许白色；前翅外线内方黑褐色，外线白色，自前缘脉微曲外斜，至 4 脉折角内弯，在亚中褶外凸，1 脉后微外斜，外线外方灰白色，布有黑褐细点，近外线有一隐约粗线与外线平行，亚端线隐约可见，浅黑褐色，较粗，曲度与外线相似，在 5 脉之前较显，顶角后有一黑褐斜纹，翅外缘各翅脉间有黑点，缘毛褐白色；后翅褐白色，横脉纹黑褐色，翅外缘前半有一列黑褐点；腹部褐灰色。

分布 黑龙江、湖北；日本，俄罗斯。

显卜夜蛾 *Bomolocha perspicua* (Leech) (图版 LXVI-41)

Hypena rhombalis var. *perspicua* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 657. (中国西部: Mou-pin, 峨眉山, 湖北宜昌, Ship-y-shan)

Bomolocha perspicua: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 912, pl. 223, figs. 31—34; pl. 357, fig. 32.

翅展 32 mm。头部与胸部褐色；前翅外线内方有一深棕色大斑，外线外方及后方灰白色杂有褐色，外线自前缘脉外斜至 4—5 脉间折角微曲内斜至翅后缘中部，与一自中室后缘基部外斜的白线相遇，环纹与肾纹仅隐约可见较暗的小斑，外线外侧有一与之平行的褐线，亚端线白色，模糊，微波浪形，自前缘脉稍内斜，至 6 脉后外斜，4 脉后折向内斜，前段内侧与外线之间有一近三角形深棕色斑，亚端线与外线之间在 5 脉后有一列深褐色斑，向后渐大，均衬以灰白色，亚端线前段外侧有一灰白色角形内斜纹，其中带有褐色，此斑外侧为深棕色，自顶角起沿此斑及亚端线直至臀角，自 5 脉后色渐浅，翅外缘有一列深棕色长点，缘毛基部灰白色，其余褐色杂白色，中部有一深棕色线；后翅褐色，端线深棕色，缘毛基部灰白色，其余褐色；腹部深褐色，背毛簇端部灰色。

分布 湖北、四川；日本。

双色卜夜蛾 *Bomolocha bicoloralis* Graeser (图版 LXVI-42)

Bomolocha bicoloralis Graeser, [1889] 1888, Berl. ent. Zeit. 32: 381. (西伯利亚: Chabarofka)