

衬以白色；后翅灰褐色；腹部灰褐色。

分布 湖南、江西、福建、四川；日本，朝鲜。

锯卜夜蛾 *Bomolocha semialbata* Sugi (图版 LXVII-1)

Bomolocha semialbata Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 18—20. (日本)

翅展 30 mm。头部与胸部褐色；前翅外线内方巧克力色，但后缘区及内线后半的内方褐白色杂黑褐色，内线不明显，在中室后强外斜，外线白色，自前缘脉微曲外弯，至 4 脉成一强外突齿，在亚中褶外弯，外线外侧有一与之平行的褐线，亚端线不清晰，由一系列黑褐色不整齐斑纹组成，其外侧均衬白色，2 脉后斑纹较大，顶角后有一黑褐斜纹，其后方有一短棒形黑褐纹，翅外缘有一列新月形黑褐点，外线外方区域褐白色；后翅灰褐色；腹部褐灰色。

分布 福建；日本。

燕夜蛾属 *Aventiola* Staudinger

Aventiola Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 602.

Type-species: *Aventiola maculifera* Staudinger.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节长，背面有鳞片，第三节短小，雄蛾触角有纤毛；胸、腹部及足胫节复鳞光滑；前翅较狭，外缘在 4 脉处略弯。

燕夜蛾 *Aventiola pusilla* (Butler) (图版 LXVII-2)

Egnasia pusilla Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. p. 67, pl. 57, fig. 9. (日本横滨)

Aventiola maculifera Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 602.

Saraca nigripalpis Hirayama, 1937, Genshoku Shensu Zolk Konchu Zufu p.90.

Aventiola pusilla: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 663. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 439. pl. 75e. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Her. Jap. p. 184. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 149. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 803. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 386.

翅展 16 mm。头部灰白色，下唇须褐色杂灰色及少许黑色，第二节上缘饰鳞为主，第三节短小；胸部背面灰白色带有褐色，足外侧褐色杂灰色；前翅灰褐色，基部带有白色，布黑色细点，基线黑色，外弯，自前缘脉至亚中褶，稍间断，内线黑色，间断，中线黑色明显，自前缘脉外斜至中室，折角微曲内斜，肾纹黑色白边，外线黑色细弱，外侧衬白色，自前缘脉外斜至 6 脉，折角波浪形内弯，亚端线白色，前半微内弯，后半波浪形内斜，中线与外线之间色较暗，外线与亚端线之间在 6 脉前有一黑褐色斗形斑，其前缘有几个白点，端线由一系列黑褐点组成；后翅灰褐色，中线较直，黑色，横脉纹为一