

Het. Sin. 3: 385.

翅展 33 mm。头部棕黑色，头顶有黑褐色杂灰白色的毛簇，下唇须向前平伸，第二节浅褐色杂黑色，上缘饰长密鳞，第三节黑褐色，端部尖，下缘饰密鳞；胸部棕黑色，足浅褐色，但前足胫节外侧黑褐色；前翅内半几全由一大棕色斑所占，其后缘自前缘脉基部后方外斜至翅后缘近中部略前，其外缘与外线平行，自前缘脉外斜至 5 脉折角内斜，斑的后方有一楔形黑纵纹，斑的外侧为细弱黑褐色外线，外线外方棕灰色，亚端线由一系列模糊黑点组成，亚端区前部有一暗褐斑，顶角有一内斜黑纹，端线棕色；后翅烟褐色，横脉纹暗褐色；腹部黑棕色。

分布 浙江、湖北、湖南、福建、四川、云南、西藏；日本。

### 齐卜夜蛾 *Bomolocha zilla* (Butler) (图版 LXVI-45)

*Hypena zilla* Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 3: 60, pl. 55, fig. 1. (日本)

*Hypena zilla*: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 657.

*Bomolocha zilla*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 432, pl. 73e. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 21—27.

翅展 28 mm。头部与胸部褐色；前翅外线内方黑褐色，外方褐白色，内线内方浅褐色，内线褐白色，自前缘脉外斜至 1 脉，环纹与肾纹不显，外线褐白色，自前缘脉微曲外斜，至 5 脉折向内斜，在亚中褶处稍外凸，外线外侧有一模糊褐线与之平行，亚端线白色外弯，内侧有模糊暗褐纹，顶角后有一黑褐内斜纹，端线由一系列新月形黑纹组成；后翅褐色，端线黑褐色；腹部灰褐色。

分布 黑龙江、湖北；朝鲜，日本。

多型种，有的个体前翅后缘区色浅，大斑短。

### 污卜夜蛾 *Bomolocha squalida* (Butler) (图版 LXVI-46)

*Hypena squalida* Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. p. 60, pl. 56, fig. 2. (日本横滨)

*Hypena squalida*: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 658.

*Bomolocha squalida*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433, pl. 73d. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 185. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 384. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 12—15.

翅展 20 mm。头部暗褐色，额下部黑褐色，下唇须向前平伸，褐色杂浅黄色及黑色，第三节端部浅黄色；胸部背面暗褐色，足浅褐色杂浅黄色；前翅 1 脉基部至后缘近中部前有一白色斜曲线，外线黑色衬白色，自前缘脉微曲外斜，至 6 脉处折向微曲内斜至后缘中部，外线内方翅色黑褐，外方褐色带灰，亚端线由黑色曲纹组成，均衬以白色，前段内侧有一约呈三角形黑褐斑，后端内侧衬一约呈长楔形黑褐纹，顶角有一褐色内斜纹，环纹只现一黑点，肾纹黑色，新月形，均极不明显，端线由一系列黑色组成，均

衬以白色；后翅灰褐色；腹部灰褐色。

**分布** 湖南、江西、福建、四川；日本，朝鲜。

### 锯卜夜蛾 *Bomolocha semialbata* Sugi (图版 LXVII-1)

*Bomolocha semialbata* Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 18—20. (日本)

翅展 30 mm。头部与胸部褐色；前翅外线内方巧克力色，但后缘区及内线后半的内方褐白色杂黑褐色，内线不明显，在中室后强外斜，外线白色，自前缘脉微曲外弯，至 4 脉成一强外突齿，在亚中褶外弯，外线外侧有一与之平行的褐线，亚端线不清晰，由一系列黑褐色不整齐斑纹组成，其外侧均衬白色，2 脉后斑纹较大，顶角后有一黑褐斜纹，其后方有一短棒形黑褐纹，翅外缘有一列新月形黑褐点，外线外方区域褐白色；后翅灰褐色；腹部褐灰色。

**分布** 福建；日本。

## 燕夜蛾属 *Aventiola* Staudinger

*Aventiola* Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 602.

Type-species: *Aventiola maculifera* Staudinger.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节长，背面有鳞片，第三节短小，雄蛾触角有纤毛；胸、腹部及足胫节复鳞光滑；前翅较狭，外缘在 4 脉处略弯。

### 燕夜蛾 *Aventiola pusilla* (Butler) (图版 LXVII-2)

*Egnasia pusilla* Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. p. 67, pl. 57, fig. 9. (日本横滨)

*Aventiola maculifera* Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 602.

*Saraca nigripalpis* Hirayama, 1937, Genshoku Shensu Zolk Konchu Zufu p.90.

*Aventiola pusilla*: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 663. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 439. pl. 75e. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Her. Jap. p. 184. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 149. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 803. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 386.

翅展 16 mm。头部灰白色，下唇须褐色杂灰色及少许黑色，第二节上缘饰鳞为主，第三节短小；胸部背面灰白色带有褐色，足外侧褐色杂灰色；前翅灰褐色，基部带有白色，布黑色细点，基线黑色，外弯，自前缘脉至亚中褶，稍间断，内线黑色，间断，中线黑色明显，自前缘脉外斜至中室，折角微曲内斜，肾纹黑色白边，外线黑色细弱，外侧衬白色，自前缘脉外斜至 6 脉，折角波浪形内弯，亚端线白色，前半微内弯，后半波浪形内斜，中线与外线之间色较暗，外线与亚端线之间在 6 脉前有一黑褐色斗形斑，其前缘有几个白点，端线由一系列黑褐点组成；后翅灰褐色，中线较直，黑色，横脉纹为一