

Het. Sin. 3: 385.

翅展 33 mm。头部棕黑色，头顶有黑褐色杂灰白色的毛簇，下唇须向前平伸，第二节浅褐色杂黑色，上缘饰长密鳞，第三节黑褐色，端部尖，下缘饰密鳞；胸部棕黑色，足浅褐色，但前足胫节外侧黑褐色；前翅内半几全由一大棕色斑所占，其后缘自前缘脉基部后方外斜至翅后缘近中部略前，其外缘与外线平行，自前缘脉外斜至 5 脉折角内斜，斑的后方有一楔形黑纵纹，斑的外侧为细弱黑褐色外线，外线外方棕灰色，亚端线由一系列模糊黑点组成，亚端区前部有一暗褐斑，顶角有一内斜黑纹，端线棕色；后翅烟褐色，横脉纹暗褐色；腹部黑棕色。

分布 浙江、湖北、湖南、福建、四川、云南、西藏；日本。

齐卜夜蛾 *Bomolocha zilla* (Butler) (图版 LXVI-45)

Hypena zilla Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 3: 60, pl. 55, fig. 1. (日本)

Hypena zilla: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 657.

Bomolocha zilla: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 432, pl. 73e. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 21—27.

翅展 28 mm。头部与胸部褐色；前翅外线内方黑褐色，外方褐白色，内线内方浅褐色，内线褐白色，自前缘脉外斜至 1 脉，环纹与肾纹不显，外线褐白色，自前缘脉微曲外斜，至 5 脉折向内斜，在亚中褶处稍外凸，外线外侧有一模糊褐线与之平行，亚端线白色外弯，内侧有模糊暗褐纹，顶角后有一黑褐内斜纹，端线由一系列新月形黑纹组成；后翅褐色，端线黑褐色；腹部灰褐色。

分布 黑龙江、湖北；朝鲜，日本。

多型种，有的个体前翅后缘区色浅，大斑短。

污卜夜蛾 *Bomolocha squalida* (Butler) (图版 LXVI-46)

Hypena squalida Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. p. 60, pl. 56, fig. 2. (日本横滨)

Hypena squalida: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 658.

Bomolocha squalida: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433, pl. 73d. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 185. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 384. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 911, pl. 223, figs. 12—15.

翅展 20 mm。头部暗褐色，额下部黑褐色，下唇须向前平伸，褐色杂浅黄色及黑色，第三节端部浅黄色；胸部背面暗褐色，足浅褐色杂浅黄色；前翅 1 脉基部至后缘近中部前有一白色斜曲线，外线黑色衬白色，自前缘脉微曲外斜，至 6 脉处折向微曲内斜至后缘中部，外线内方翅色黑褐，外方褐色带灰，亚端线由黑色曲纹组成，均衬以白色，前段内侧有一约呈三角形黑褐斑，后端内侧衬一约呈长楔形黑褐纹，顶角有一褐色内斜纹，环纹只现一黑点，肾纹黑色，新月形，均极不明显，端线由一系列黑色组成，均