

翅展 22—26 mm。头部与颈板黄色；胸部赭红，中胸一黄斑，后胸一黄色大斑；前翅赭红，前缘脉基部一黄斑，内线前后端各一黄点，中线由黄斑列成，中室下角一黄斑，中线外方有四个黄点，中线后端外侧一黄点，翅外缘一系列小黄斑，顶角的斑大；后翅褐黑色；腹部黑色。雄蛾抱器瓣窄长，抱钩棘形（图 502）。

寄主 牡荆属。

分布 湖南、福建、广东、云南；缅甸，斯里兰卡，新加坡，马来西亚等。

斑夜蛾属 *Borbotana* Walker

Borbotana Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1651.

Type-species: *Borbotana nivifascia* Walker.

Choluata Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc. zool. 7: 57.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额平滑，复眼大，圆形，触角基节有大鳞簇，雄蛾触角一般锯齿形，有长纤毛；胸部主要是鳞片，前、后胸有散开的毛簇，胫节密被鳞片；腹部基部几节有毛簇；前翅顶角长方形，外缘曲度平稳，无副室，8—10脉共柄，或雄蛾 8、9 脉共柄。

斑夜蛾 *Borbotana nivifascia* Walker (图版 XXXIII-22)

Borbotana nivifascia Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1651. (沙撈越)

Borbotana nivifascia: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 584. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 267.

翅展 22—26 mm。头、胸深褐杂白色，后胸有白斑；前翅灰棕色，内线、外线间棕色，内线白色波浪形，肾纹大，白色，外线白色，与肾纹连在一条线上，前端位于肾纹前，成一白斑，在肾纹外侧微弱，在肾纹后为白线，在翅后缘为白斑，顶角有一暗红褐纹，端线黑色；后翅浅褐色；雄蛾触角锯齿形，有长纤毛，前翅反面 6—7 脉间有膜质沟，边缘隆起；腹部黄褐色。

分布 云南；锡金，马来西亚。

希夜蛾属 *Eucarta* Lederer

Eucarta Lederer, 1857, Noct. Eur. p. 168.

Type-species: *Noctua amethystina* Hübner.

Placodes Boisduval, 1840, Ind. Meth. p. 129.

Telesilla Herrich-Schäffer, 1856, Schmett. Eur. p. 47.

Callogonia Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 589.