

Iteophaga Boursin, 1965, Ent. Ber., Berl. 1964 (3): 133.

喙发达，下唇须向前伸，下缘饰长毛，额平滑无突起，眼稍小，圆形，雄蛾触角多双栉状；头部与胸被毛和毛状鳞，前、后胸有散开形毛簇，下胸与足胫节饰长毛；腹部基部几节有毛簇；前翅有副室，后翅 6、7 脉共柄。

种 检 索 表

- 前翅中区有一黑带 偶柳冬夜蛾 *Brachylomia pygmaea*
前翅中区无黑带 维柳冬夜蛾 *B. viminalis*

偶柳冬夜蛾 *Brachylomia pygmaea* (Draudt) (图版 XXIV-13)

Bombycia pygmaea Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 61, pl. 4, fig. 17. (云南德钦)
Iteophaga pygmaea: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 105. ——Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p.1017.

翅展 29mm。头、胸及前翅灰色杂暗褐色；前翅亚中褶一黑纵纹，端部宽而分叉，基线、内线黑色，后者双线波浪形，剑纹黑色长方形，环纹、肾纹灰白色，外线黑色锯齿形，中室大部及其后方带黑色，成带状，亚端线褐色锯齿形，端区翅脉微黑；后翅浅黄灰色，亚端线暗褐色；腹部灰褐色。

分布 四川、云南。

维柳冬夜蛾 *Brachylomia viminalis* (Fabricius) (图版 XXIV-14)

Noctua viminalis Fabricius, 1777, Gen. In. p.284. (德国)
Bombycia viminalis: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 219. ——Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 122.
Iteophaga viminalis: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 105.
Brachylomia viminalis: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 726.

翅展 30mm。头部白色；胸部及前翅灰白杂暗褐色，亚中褶基部一黑纹，基线、内线、中线及外线黑色，内线双线，剑纹黑边，环纹白色，肾纹灰白色，中线粗，亚端线白色，内侧衬黑色；后翅黄白带褐色；腹部白色带红褐色。

寄主 柳。

分布 黑龙江、甘肃、新疆；欧洲。

珂冬夜蛾属 *Lithomoia* Hübner

Lithomoia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p.244.
Type-species: *Noctua solidaginis* Hübner.