

male genitalia. (日本)

翅展 22 mm。头部、胸部及前翅浅灰褐色，内线细，褐色，在亚前缘脉后较直内斜，中线粗，褐色，较模糊，在中室后内斜，肾纹小，黑褐色，外线黑褐色，内斜，前半微波曲，亚端线双线黑褐色，自顶角内斜，两线前端接近，向后渐分离，外一线微波曲，端区带有浅黄色，端线黑色，波浪形；后翅浅黄色，中线、外线及亚端线深褐色，均仅中段明显；腹部褐色。

分布 海南；日本。

短栉夜蛾属 *Brevipecten* Hampson

Brevipecten Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 361.

Type-species: *Euclidia captata* Butler.

喙发达；下唇须细小，斜向前伸，第二节微小，额平滑，雄蛾触角双栉形达 3/4 长度；胸部和腹部鳞片平滑，胫节外侧有微小毛簇；前翅顶角较钝，外缘曲度平稳，后缘除基部微膨大外，其余较直，有副室；后翅 5 脉自中室下角的前方伸出。

种 检 索 表

1. 前翅前缘区中部黑斑与亚顶斑后端有黑纹 缀斑短栉夜蛾 *Brevipecten costiplaga*
前翅前缘区中部黑斑与亚顶斑后端无黑纹 2
2. 前翅中区黑斑宽 胞短栉夜蛾 *B. consanguis*
前翅中区黑斑窄 短栉夜蛾 *B. captata*

缀斑短栉夜蛾 *Brevipecten costiplaga* Draudt (图版 LXIII-21)

Brevipecten costiplaga Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 169, pl. 7. fig. 23. (西天目山)

Brevipecten costiplaga: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 373.

翅展 25 mm。头部黑棕色，杂有灰色，下唇须端部微黄；胸部背面黄褐色，杂有少许灰色及黑褐色，翅基片紫灰色，前、中足胫节外侧杂有黑色并有黑色条纹，跗节外侧各节间有白斑；前翅淡褐色，前缘区带有粉白色，基线仅在前缘脉上现一黑点，内线灰白色，波浪形外斜，在前缘脉上为一黑点，环纹淡褐色，白边，内侧有细黑线，肾纹褐色，前端围以白色，其余外围黑色，不完整，外缘中部凹，并伸出一弧形黑纹，环纹与肾纹之间有一黑棕色斑并向前伸成斗形，剑纹仅在端部可见一黑点，外线白色，锯齿形，自前缘脉后外弯，4 脉后内弯，前端外侧有一斗形黑棕色斑，5—6 脉间有一新月形黑纹，亚端线白色，波浪形，端线由一系列黑点组成；后翅褐色，缘毛微黄；腹部灰黄色，背面带有暗褐色。

分布 浙江、福建。

胞短栉夜蛾 *Brevipecten consanguis* Leech (图版 LXIII-22)

Brevipecten consanguis Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 513. (湖北宜昌、长阳)

Brevipecten consanguis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 387, —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 169. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 373. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1030.

翅展 28 mm。头部棕灰色，下唇须外侧深棕色；胸部背面棕灰色，前、中足胫节及跗节外侧褐黑色；前翅棕色杂有灰白色，基线黑色，自前缘脉至中室后缘，内线黑色，直线外斜，中线黑色，仅中室后可见较直外斜，肾纹灰褐色，黑褐边，内侧有一砧形黑棕色斑，前方黑褐色达前缘脉，外线黑色，自前缘脉后外斜，在 6 脉处折成一圆钝外凸角，其后较直内斜，后端与中线相遇于翅后缘，外线前端外方有一黑棕色近三角形斑，后缘钝，端线黑棕色，端区色暗，翅脉黑棕色；后翅灰褐色；腹部背面褐灰色，腹面灰黄色。

分布 山东、江苏、湖北、湖南、福建、海南、广西、四川、云南。

短栉夜蛾 *Brevipecten captata* (Butler) (图版 LXIII-23)

Euclidia captata Butler, 1889, Ill. Het. Br. Mus. 7: 79, pl. 133, fig. 1. (印度)

Brevipecten promona Swinhoe, 1918, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 88.

Brevipecten captata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 361. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 386. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 373.

翅展 30 mm。头部灰色，密布黑点，下唇须第一、二节外侧黑色，前缘白色，第三节外侧白色；胸部背面紫灰色，密布黑色细点，颈板近端部有一黑色横线，翅基片基部黑褐色，前、中足胫节及跗节外侧褐黑色；前翅灰色，密布黑褐色细点，基线黑褐色，自前缘脉至中室后缘，微外斜，内线黑褐色，内侧衬浅灰色，稍外斜，中段微内弯，肾纹黑色，外侧衬白色并内凹，前方模糊黑褐色达前缘脉，与肾纹几成一体，外线黑褐色，自前缘脉后外弯，在肾纹外方为外斜线，至 4 脉中断，再自 2 脉基部起微曲外斜，亚端线黑色，自前缘脉后外斜，在 4 脉折角内斜，后端与外线相遇于翅后缘，前端外方有一黑色近三角形斑，端线黑色，波浪形，端区色暗褐，缘毛深褐色；后翅褐色，端区黑褐色，臀角处外缘毛白色；腹部褐色。

分布 广东；印度等。

漠夜蛾属 *Anumeta* Walker

Anumeta Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1769.