

黑色圆点，外线黑色，锯齿形，前半明显外弯，亚端线浅褐色，锯齿形，中段外弯，后半部两侧衬黑色，端线由一系列黑点组成，翅外缘中部外凸；腹部褐黑色，基部背面褐色，各节间灰色。

寄主 地衣。

分布 黑龙江、河北、江苏、四川；日本。

箭夜蛾属 *Britha* Walker

Britha Walker, [1866] 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1146.

Type-species: *Britha bifuttata* Walker.

Hyposemia Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. part 9, 30: 121.

喙发达，下唇须斜向前伸，很长，上缘饰长毛，雄蛾触角双栉形，栉齿端部有长刺毛；腹部第一、二节背面有毛簇，雄蛾前翅反面后缘区有一大平片，1脉上有长毛簇；后翅前缘拱曲，有一大平片，3、4脉共柄，6、7脉共柄，5脉发达，自中室下角发出。

种 检 索 表

前翅外线为深褐色宽带 隐箭夜蛾 *Britha inambitiosa*
前翅外线不成带状 箭夜蛾 *B. biguttata*

箭夜蛾 *Britha biguttata* Walker

Britha biguttata Walker, [1866] 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1147. (昆士兰)

Herminia incertalis Walker, [1866] 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1147.

Hypena colabalis Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 120, fig. 29.

Hyposemeia incertalis: Hampson, 1893, Ill. Het. Colln B. Mus. 9; pl. 166, fig. 21.

Britha biguttata: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 94, fig. 44. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 663. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 439, pl. 75e. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 386.

翅展 20 mm。头部淡灰褐色，雄蛾触角双栉形，下唇须向前斜伸，第二、三节均长，第二节上缘饰长毛，第三节上下缘均饰长毛；胸部淡灰褐色；前翅灰色杂有暗褐色，内线暗褐色，自前缘脉外斜至中室前缘折角内斜，肾纹仅外缘现一白纹，外线黑褐色，自前缘脉外斜至 8 脉，成一尖外凸角，其后内斜，线外侧衬白色，一浅褐色线自顶角直线内斜，亚端线白色，波浪形，至 5 脉后分为两条，端线黑褐色，缘毛基部有一白线；后翅褐色，外线白色；雄蛾前翅反面自中室至亚中褶有一大平滑区域，1脉处有扇形长毛簇；腹部浅灰褐色。

分布 广西；印度尼西亚，斯里兰卡，大洋洲。