

隐箭夜蛾 *Britha inambitiosa* (Leech) (图版 LXVII-3)

Hypena inambitiosa Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 660. (九江)

Britha inambitiosa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World. 3: 439, pl. 75e. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 174. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 887, pl. 219, fig. 16; pl. 355, fig. 21. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 386.

翅展 35 mm。头部暗灰褐色，雄蛾触角双栉形，齿端有较长刺，下唇须斜向上伸，第二、三节上缘饰长毛；胸部暗灰褐色；前翅灰褐色，内线较粗，深褐色，外斜，在亚中褶处稍折曲，环纹只现一深褐点，外线为一深褐色宽带，其外缘在中褶处外凸，外侧衬灰白色，亚端线暗褐色，模糊，在 7 脉及 4 脉处外凸，内侧暗褐色较宽，似一带状；后翅淡褐色；腹部暗灰褐色。雄蛾前翅反面自中室至亚中褶有一平滑区域，1 脉处有扇形长毛簇。

寄主 白辛树属。

分布 浙江、江西；日本。

修夜蛾属 *Perciana* Walker

Perciana Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 812.

Type-species: *Perciana marmorea* Walker.

喙发达，下唇须向上斜伸，第二节达头顶，第三节长，雄蛾触角线形，有纤毛丛；后胸有一尖毛簇，翅基片端部有竖立长鳞片；腹部第二节背面有很长竖立鳞簇，第三节背面有一小鳞簇，臀节有一扁平鳞簇，胫节饰毛；前翅外缘中部折曲，有一副室；后翅 5 脉发达。

修夜蛾 *Perciana marmorea* Walker (图版 LXVII-4)

Perciana marmorea Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 813. (印度)

Perciana marmorea: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 296, fig. 161.

翅展 25 mm。头部白色，头顶有黑斑，其两侧浅褐色，颈板浅褐色，中央有黑斑，端缘白色；胸部灰褐色杂白色，翅基片基部黑色；后翅有一黑斑；前翅白色带褐色，翅脉上有黑白点及碎纹，内线仅在中室前现一外斜黑纹，内区在 1 脉后有一近三角形黑斑，环纹白色，扁圆形，有渗化的黑边，肾纹色似环纹，但中央的白色成一点状，外线不清晰，黑色，自前缘脉外斜，5 脉后内斜并波曲，在折角处外侧有一模糊黑斑，外线外方在亚中褶处有一黑斑，翅外缘中部外突，前、后半凹，端线黑色；后翅白色，微带褐色，端线褐色；腹部白色，背面鳞簇黑色。